

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

КАРМІНАТИВУМ БЕБІНОС
(CARMINATIVUM BABYNOS)

Склад:

діючі речовини: * 1 г розчину (24 краплі) містить рідкі екстракти (1 : 1, етанол 50 %): гіркого фенхелю (*Foeniculi amari fructus*) 320 мг, коріандру (*Coriandri fructus*) 200 мг, квіток ромашки (*Matricariae flos*) 200 мг;

допоміжні речовини: сорбіту розчин 70 % (Е 420), пропіленгліколь, сахарин натрію.

*Лікарський засіб містить 36 об. % етанолу розведеного.

Лікарська форма. Краплі оральні, розчин.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий розчин темно-брунатного кольору.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при функціональних розладах з боку травного тракту.

Код АТХ А03А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Доведено, що кожен із трьох активних рослинних компонентів (рослинні екстракти стандартизованої фармацевтичної якості) чинить помірну вітрогінну дію та сприяє нормалізації перистальтики шлунково-кишкового тракту.

Фенхелю екстракт рідкий чинить вітрогінну та спазмолітичну дію.

Коріандру екстракт рідкий чинить вітрогінну та секретомоторну дію.

Ромашки екстракт рідкий виявляє вітрогінний, протизапальний ефекти, чинить протимікробну та спазмолітичну дії.

Препарат не спричиняє карієсу зубів.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Для запобігання та лікування метеоризму будь-якого генезу, розладів з боку травної системи різного генезу у дітей.

Противоказання.

Підвищена чутливість до сорбіту (непереносимість фруктози), гіперчутливість до компонентів лікарського засобу, до рослин родини селерових та складноцвітих.

Особливі заходи безпеки.

Препарат містить 36 об. % спирту, тому дітям віком до 6 років разову дозу слід розводити, знизивши концентрацію не менше ніж у 100 разів, дітям віком 6–12 років – не менше ніж у 10 разів (див. «Спосіб застосування та дози»).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідомі.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Лікарський засіб застосовують тільки дітям.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Препарат застосовують тільки дітям.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують тільки дітям. Приймають внутрішньо. Дітям віком до 12 років препарат обов'язково слід розводити чаєм або водою. Препарат застосовують 3 рази на добу.

Вік	Доза	Розведення
Від 6 місяців до 1 року	3–6 крапель	1 крапля в 5 мл рідини
Від 1 до 6 років	6–10 крапель	
Від 6 до 12 років	10–15 крапель	1 крапля в 1 мл рідини

Перед застосуванням розчин збовтати, при відмірюванні крапель тримати флакон дном догори.

Діти. Даний препарат призначають дітям віком від 6 місяців до 12 років.

Передозування. Симптоми передозування не спостерігалися. Випадки інтоксикації невідомі.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можуть виникнути алергічні реакції, у тому числі гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри.

Термін придатності. 3 роки 6 місяців. Після першого відкриття флакона препарат придатний до застосування протягом 1 року.

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С у щільно закритій упаковці.

Упаковка. По 30 мл у скляному флаконі-крапельниці брунатного кольору у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. «Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарати Ленк та Шуппан», Німеччина / «Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan», Germany.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. Нунсдорфер Рінг 19, 12277 Берлін, Німеччина / Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin, Germany.