

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЗВІРОБОЮ ТРАВА
(HYPERICI HERBA)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: звіробоя трава.

Лікарська форма. Трава.

Шматочки подрібненої рослинної сировини.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Засоби для застосування у стоматології. Код АТС А01А D11.

Біологічно активні речовини рослини чинять в'язучу, протизапальну і деяку протимікробну дію, що сприяє регенерації тканин; помірно впливають на жовчовиділення, збуджують шлункову секрецію.

Показання для застосування. У складі комплексної терапії захворювань жовчовивідних шляхів (дискінезій жовчних шляхів, холециститів); шлунково-кишкового тракту (гострих і хронічних колітів, проносів, метеоризму, гіпоацидного гастриту).

При запальних процесах ротової порожнини (гінгівітах, стоматитах).

Протипоказання. Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Артеріальна гіпертензія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказане внутрішнє застосування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Застосування препарату у деяких пацієнтів може спричинити підвищення артеріального тиску, тому слід бути обережними при керуванні автотранспортом та роботі зі складними механізмами.

Діти.

Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози. 1,5 столової ложки трави поміщають в емальований посуд, заливають 200 мл гарячої кип'яченої води, закривають кришкою і настоюють на киплячій водяній бані 30 хв. Проціджують, залишок віджимають до процідженого відвару. Об'єм відвару доводять кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовують у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослі та діти віком від 16 років – по 1/3 склянки, діти віком 12-14 років – по 1-2 столових ложки, діти віком 15-16 років – по 1/4 склянки.

2 фільтр-пакети поміщають у скляний або емальований посуд, заливають 200 мл окропу, закривають і настоюють 15 хвилин. Застосовують у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослі та діти віком від 16 років – по 1/2-1 склянці, діти віком 12-14 років – по 1/4 склянки, діти віком 15-16 років – по 1/2-1/3 склянки.

Зовнішньо застосовують для полоскання ротової порожнини.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Передозування та тривале застосування спричиняє відчуття гіркоти у роті, неприємні відчуття в області печінки.

Побічні ефекти. Підвищення артеріального тиску; алергічні реакції (гіперемія, висипання, набряк та свербіж шкіри); фотосенсибілізація (під час лікування слід уникати УФ-випромінювання).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендовано застосування хворим, які приймають антикоагулянти, антибіотики, сульфаніламідни, протизаплідні, гіпотензивні – блокатори кальцієвих каналів, жіночі статеві гормони, гіпохолестеринемічні засоби (статици), серцеві глікозиди.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 75 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЗВЕРОБОЯ ТРАВА
(HYPERICI HERBA)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: зверобоя трава.

Лекарственная форма. Трава.

Кусочки измельченного растительного сырья.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Средства для применения в стоматологии. Код АТС А01А D11.

Биологически активные вещества растения проявляют вяжущее, противовоспалительное и некоторое противомикробное действие, что способствует регенерации тканей; умеренно влияют на желчеотделение, возбуждают желудочную секрецию.

Показания к применению. В составе комплексной терапии заболеваний желчевыводящих путей (дискинезий желчных путей, холециститов); заболеваний желудочно-кишечного тракта (острых и хронических колитов, поносов, метеоризма, гипоацидного гастрита).

При воспалительных процессах полости рта (гингивитах, стоматитах).

Противопоказания. Индивидуальная гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Артериальная гипертензия.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказано внутреннее применение препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение препарата у некоторых пациентов может вызвать повышение артериального давления, поэтому необходимо быть осторожным при управлении автотранспортом и работе со сложными механизмами.

Дети.

Противопоказано применение препарата детям до 12 лет.

Способ применения и дозы. 1,5 столовой ложки травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 30 минут. Процеживают, остаток отжимают в процеженный отвар. Объем отвара

доводят кипяченой водой до 200 мл. Применяют в теплом виде 3 раза в сутки за 30 минут до еды: взрослые и дети старше 16 лет – по 1/3 стакана; дети 12-14 лет – по 1-2 столовые ложки, дети 15-16 лет – по 1/4 стакана.

2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл кипятка, закрывают и настаивают 15 минут. Применяют в теплом виде 3 раза в сутки за 30 минут до еды: взрослые и дети старше 16 лет – по 1/2-1 стакану, дети 12-14 лет – по 1/4 стакана, дети 15-16 лет – по 1/2-1/3 стакана.

Наружно применяют для полоскания полости рта.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Передозировка и длительное применение вызывает чувство горечи во рту, неприятные ощущения в области печени.

Побочные эффекты. Повышение артериального давления; аллергические реакции (гиперемия, сыпь, отек и зуд кожи); фотосенсибилизация (во время лечения следует избегать УФ-излучения).

Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не рекомендовано применение больным, принимающим антикоагулянты, антибиотики, сульфаниламиды, противозачаточные, гипотензивные – блокаторы кальциевых каналов, женские половые гормоны, гиполипидемические средства (статины), сердечные гликозиды.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 75 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакетах № 20.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу