

From:

To:

Date: 4/21/2022 12:56:40 AM

Subject:

Attachments: .thmx

(MEPRAZOL)

:

: meprazole;

1

(8,5 %) 20 ;

(: , (171), (104). (421), (), (171), ;

2,

02 01.

Helicobacter pylori.

Helicobacter pylori

) 10 % (- 30 %). (20

40 %,

CYP2C19.

(40 1 8)

75-90 %.

300 / 100

75 %

(40 1)

400

/ 300 / 100

30 %

(20 1)

400

100 1

(20 /)

10 %.

(80

(- 300 , - 75 /)

(24) 30 % (5),

46 % (1) 42 % (5).

47 %

CYP2C19.

CYP2C19.

CYP2C19,
CYP2C19,

R-

/ (- 300 /

- 75)

(80 /

,

46 %

4

(-),

16 %.

40

max AUC

18 % 26 %

- 29 % 69 %

70 %,

(),

CYP2C19 / CYP3A4.

CYP3A4,

(,

CYP2C19 CYP3A4,

, , ,

CYP2C19

CYP3A4,

CYP2C19 / CYP3A4,
CYP3A4.

CYP2C19 CYP3A4,

(,),

CYP2 19.
CYP2 19,

Salm nella Campylobacter.

10-40 %.

D

1

3

1).

1 / .

5

14

(1000

)

/

/

,

.

12

-8

-1

2

4

H. pylori

20

-4-8

40

(

20

2

)

:

250

1

2

:

1

500

;

1

2

400 ;

400

(

500

);

1

3

:

500

500 ;

2

2

:

750

-1 ;

2

3

:

2

2

750

-1

2

8

-4-8

40

40

2-6

80-120

2-3

10-20

2-4

60

;

80

20

-4-8

;

5

20

20

-2-4

20

40

(10).

H. pylori

5

14 .

-7

30-40

20

750

7,5 /

2

7

;

40 :

20 ,

1 ,

500 2

7 .

5

H. ylori,

560

2400

(120

).

(1/10 000, < 1/1000), (< 1/10 000), ((1/10), (1/100, < 1/10), (1/1000, < 1/100),

1 (8,5 %) 20 ;

(:), (171), (104). (E 421), ;

2, - - .

02 01.

- . +, +- -

(), *Helicobacter pylori.* *Helicobacter pylori*

> 4 24
(90 %).
2-

() 5 2

50-55 % ()
- 95 %.

() 1-

20
24 ,
3-5

2

6 ,

(72-80 %)

(18-23 %).

0,5-1 (

) 3 (

).

Helicobacter pylori (

();

; - ;

.

(20)

10 % (- 30 %).

40 %,

(40 1)

75-90

%.

CYP2C19.

(40 1)

75 %

300 /

100

400

(20 1)

400 / 300 / 100

100 1 .

30 %

(20 /)

10 %.

(80)

(- 300 , - 75 /)

46 % (1) 42 % (5).

47 % (24) 30 % (5),

CYP2C19.

/

CYP2C19.

CYP2C19,

CYP2C19,

R-

- 75)

(80 /

(- 300

),

(-)

16 %.

46 %

40

max AUC

18 % 26 %

- 29 % 69 %

70 %,

3

1)

(

;

1 /

5

14

(1000

)

/

/

12

-8

-1

2

4

20

-4-8

H. pylori:

40 (20 2)

— 2 : 1 2 : 1 500 ; 1

250 400 (500); 1 3 : 500 400 ;

— 500 ; 2 2 : 750 - 1 ; 2 3 :

— 2 2 : 750 - 1 . - 4-8 . - ,

, 2 : 8 - 1 , - 40 40 2-6

. - : , 60 ;

80 , 80-120 2-3 . 10-20 2-4 . 4

, : 20 . 20 . 5

— . - 4-8 ; 20 , 40 . - 2-4 .

(10). , , *H. pylori* 5 ,

— : 30-40 : 20 , 750 , 7,5 / 2 7 ;

— 40 : 20 , 1 , 500 2 7 . 7 ;

. 5 - , *H. ylori*, .

— : 30-40 : 20 , 750 , 7,5 / 2 7 ;

— 40 : 20 , 1 , 500 2 7 . 7 ;

. 5 - , *H. ylori*, .

— : 30-40 : 20 , 750 , 7,5 / 2 7 ;

— 40 : 20 , 1 , 500 2 7 . 7 ;

. 5 - , *H. ylori*, .

2400

(120

).

/100), (1/10 000, < 1/1000), (< 1/10 000), ((1/10), (1/100, < 1/10), (1/1000, < 1

25° .

10 . ; 1 3 .

« . » , .

08132, , - , . , . , 6. .