

®
(AMOXIL)

1 :
: *amoxicillin*;
, (), , - 250 500 ;

J01C A04.

- : *Corinebacterium diphtheriae, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus bovis, Streptococcus pyogenes*;

- : *Helicobacter pylori*;

- : *Peptostreptococci*;

- : *Borrelia*.

(): *Corinebacterium spp., Enterococcus faecium, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis, Prevotella, Fusobacterium spp.*

, : *Staphylococcus aureus, Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Legionella, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia, Pseudomonas, Serratia, Bacteroides fragilis, Chlamidia, Mycoplasma, Rickettsia.*

(85-90 %).

500

1-2

6-11 / .

20 %

20 %

1-1,5

60-80 %

6

2-4

8,5

Helicobacter pylori,

(/ -),

).

(

(,) .

),

()



_____.

iii : i i i

(10-15 %)

()

()

().

(« »);

(« »)

(« »),

- *Borrelia burgdorferi*.

(« » « »).

(. « »).

Clostridium difficile,

(. « »).

Helicobacter pylori

500 – ®, 6,622 / 9,933 /),

(250 3,311 / 4,967 / ;

25-30 %

/

(,)

(,)

40 250 500 1000 500 1000 6
 40 40-90 / / 100 / 5-7 25 45 / /

48

12-24 (< 10 / , 0,16 /),
 15-50 %.

5

* : . ,

, ' . ,

.4 .

. 25 ° .

. 10 , 2 .

/ . « ».

,01032, . , . ,139.

(AMOXIL)

1 :
 : *amoxicillin* ;
 , () , - 250 500 ;
 :
 - . :
 . :
 . - , . J01C A04.

- : *Corinebacterium diphtheriae*, *Enterococcus faecalis*, *Listeria monocytogenes*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus bovis*, *Streptococcus pyogenes*;
- *Helicobacter pylori*;
- : *Peptostreptococci*;
- : *Borrelia*.

():
Corinebacterium spp., *Enterococcus faecium*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus viridans*, *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Proteus mirabilis*, *Prevotella*, *Fusobacterium spp.*
 : *Staphylococcus aureus*, *Acinetobacter*, *Citrobacter*, *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Legionella*, *Morganella morganii*, *Proteus vulgaris*, *Providencia*, *Pseudomonas*, *Serratia*, *Bacteroides fragilis*, *Chlamidia*, *Mycoplasma*, *Rickettsia*.

500 (85-90 %).
 1-2 6-11 / .
 20 % , , 2-4
 20 % (,)
 1-1,5 60-80 % 6 8,5

(
Helicobacter pylori),

(10-15 %)

()

()
().
(

« »);

« »)

(« »),
Borrelia burgdorferi.

(« » « »).

(« »).

(*Clostridium difficile*),

«
500 – 6,622 / 9,933 /),
/

Helicobacter pylori

250 3,311 / 4,967 / ;
25-30 %

(;)

• , 25 ° .
• 10 , 2 .
• .
/ . « ».
• ,01032, . , . ,139.