

(ARILENTAL)

C :

1 : aripiprazole; 10 15 ;
(102); (101); ; ; ;

«ZL» , 10 , 7 ,4 : , «10»
, ; , 15 , 7 ,4 : , «15» «ZL»

N05A X12.

_____ (). , D₂- 5HT₁ - 5HT₂ -
, 5HT₂ - 5HT₇- *in vitro* D₂- D₃- , 5HT₁ - 5HT₂ - D₄-
, 1- H₁- .

0,5 30 1 2 , 11 - ,

D₂/D₃-

() · C_{max}
- 87%.

3-5

99 %

(Vd) 4,9 / ,

:
CYP3A4 CYP2D6, N-
- CYP3A4.

. *In vitro*

AUC

40 % AUC

(T_{1/2})

75

CYP2D6

146

CYP2D6.
¹⁴C

27 % 60 %

1 %

18 %

0,7 / / ,

10 17

(, - ') ,
(- ').

I ,

1-

(),

(. « »).
QT

H₂-

CYP2D6 CYP3A4, CYP1A.

CYP2D6.

CYP2D6 ()

AUC

107 %,

C_{max}

. AUC

C_{max}

32 %

47 %

CYP2D6,

CYP3A4.

CYP3A4 ()

AUC

C_{max}

63 %

37 %

AUC

C_{max}

77 %

43 %

CYP2D6

CYP3A4

CYP2D6.

CYP3A4

CYP3A4,

(CYP2D6 « CYP3A4 »).

CYP3A4 ()

CYP2D6 ().

CYP3A4.

30

CYP3A4,

68 % 73 %

(C_{max})

«

- » (AUC)

69 % 71 % C_{max} AUC

CYP3A4 (, , , , , , ,)

CYP3A4

10-30

CYP2D6 (/3-),

CYP2C9 (), CYP2C19 () CYP3A4 ().

CYP1A2 *in vitro*.

(« »).

»).

;

/

),

(« »).

«

»).

(«

»

() , : (- 84 ; 78-88) ,

»).

(. « »).

I

(, ; . « »).

/10000 – < 1/1000),

(< 1/10000),

(

).

,

,

,

,

.

			’ ’
			(; ’ ; ’, ’ ’)
		-	,
			’ , ,
	, ,	, ,	, (. « »), , , , , , , , , , ,

	,	,	(),
	,	,	,
	,	,	,
			,
			,
			QT,
			,
			,
			(
),
,			,
	,		,
	,		,
	,		,
	,		-
			,
			,
			,

			(), (), - (),
			, ,
- ,			, ,
			,
,			« (. »)
			(,), ,
			, , ,

:

,

:

,

,

,

,

,

,

/

.

,

.

.

,

,

,

,

3,5 %

,

.

,

.

,

,

/

.

,

.

.

.3

.

25°

.

. 7

,

4

.

.

./Actavis Ltd.

BLB015, BLB016, , ZTN3000, /
BLB015, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta.

« ».

. ,9, . ,LT02189, .