

®  
**(BISEPTOL®)**

1 :  
1 : (co-trimoxazole);  
1 100 /20 100 , 20 ;  
1 400 /80 400 , 80 ;  
: , , , .  
- :  
100 /20 - , , , , ,  
, «Bs»;  
400 /80 - , , , , ,  
, «-», «Bs».

J01E E01.

- *in vitro* *E.coli* ( ), *Proteus spp.* ( *P.vulgaris*),  
*Morganella morganii*, *Klebsiella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Enterobacter sp.*, *Hemophilus influenzae*, *Str.pneumoniae*, *Shigella flexneri*, *Shigella sonnei*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Pneumocystis jirovecii*.

1 4 , 70 %, - 44 62 %.

0,36 / ,

-2,0 / .

72

84,5 %

66,8 %

10

8 10

® (

i  
i

)

1,7 24

7,5 10

( .

«

»).

( 1 3,6 ),

®,

(

*Pneumocystis jirovecii*),

*Shigella flexneri* *Shigella sonnei*,  
*Escherichia coli*, (

( , ).

6 ( ).

23 % 9 %,

10 %.

®

CYP2C8 (

) CYP2C9 (

OCT2

®

®,

*in vitro.*

®

( , , ),

\_\_\_\_\_:

500

4

260

800

39 %,

27 %.

25 /

\_\_\_\_\_:

800 + 160 ( - )

40 %

\_\_\_\_\_:

( - )

\_\_\_\_\_:

*neumocystis jirovecii.*

\_\_\_\_\_:

®

»).

«

®

c

,

-

(

,

,

,

,

,

)

.

,

,

®

.

,

,

,

®

(Hb- , Hb- ),

®

,

,

(

),

.

.

,

.Ko-

-

,

.

,

(

«

»).

®

,

(

,

)

,

,

,

( 1,5 ).

(5 10 / )

®

-

,

,

-

,

,

®

,

,

,

.

:

,

,

,

,

,

,

-

,

,

,

/

-

(

,

)

*Clostridium difficile*,

*Clostridium difficile* (

10 %

®

« »

-6-

6

( , , , , , ) ,

12 2 ® 400 / 80 8 ® 100 / 20 2  
 ( ) .  
 ® 400 / 80 12 , ® 100 / 20 2 .  
 ® 400 / 80 4 ® 100 / 20 2 14 3  
 6 12 6 ® 400 / 80 4 ® 100 / 20 2  
 30 1

6 12 1 ® 400 / 80 4 ® 100 / 20 2

6 - ( ) . 5 2

5 7 . 4 ,  
 ( 6 8 ® 400 / 80 3 ) .

*Pneumocystis jirovecii* :

21 . 90-120 / , 6

1. ® , *Pneumocystis jirovecii*.

[ ]	6
16	480
24	720
32	960
40	1200
48	1440
64	1920
80	2400

), *Pneumocystis jirovecii* ( .

® 400 / 80 2 ( )

4 *Pneumocystis jirovecii*

6 12 : 900 - / 2 (8 (120 2 (480) 1 , 7 .

2. ®, , *Pneumocystis jirovecii*

[ 2]	, 12 ( - )
0,53	240
1,06	480

( 12 ):

		(% )	
/ ,	m / ,		
> 25	: < 265 : < 175	100	12
15-25	: 265 620 : 175 400	50	12 24
< 15	: > 620 : > 400		, ,

). 150 / , ( 12 , 120 / . 50 % 44 % 57 %

®

6 . 6

( ).







(5 10 / ).

*Pneumocystis carinii* (*Pneumocystis jirovecii*),

®.

( 65 % )

® 20 25 %

25° .

20  
100 /20 .  
400 /80 .

; 1000

20 , 1 ; 14 , 1 ; 1000 .

•

.

« • » ,

. . . 5, 95-200, ' , . •