

® **40**
(CORINFAR® UNO 40)

1

40 ;

, , (172), (171).

7 ,

X 08 05.

1,4-

« »

()

c

50 70 %.

«

»

95 98 %

30 85
().

(V_{ss})

0,77 1,12 / .

5 15 %

24

(0,1 %)

,
« »() .

450 3 4.

450 3 4

450 3 4

CYP3 4.

450 3 4.

, *in vitro*

450 3 4

()

450 3 4.

, *in vitro*

450 3 4

, *in vitro*

450 3 4

/

/

450 3 4

, 450 3 4,

450 3 4.

,

,

,

,

; ;
- ();
- 1- ;
- ;
- E-5 (-5);
- ;

, ().

450 3 4.

450 3 4.

(90 . .),

().

(, ,).

450 3 4,

, .
— ,

,

«

»

, , :
— ();
— ();
— ;
— / ;
— ;
—

450 3 4

in vitro

, , , ,
, , , ,
, , , ,
,

in vitro

,

“ ® 40°.

/ ,

,

, , , ,
,

2-

().

/

,

in vitro

,

2

in vitro

,

,

1

,

•

,

,

1

()

$$1 \quad 1 \quad (-40 \quad 1) \quad).$$

(), 1

).

“[®] 40”

30

(, 1

(65).

(18)

65

,
 ,
 ,
).

10

; 2 5, 10

3,89143

.3