

®
(HERPEVIR®)

:
400 ; : 1 100 % 200

· ·
- :
200 : , , ;
400 : , , ;

AT J05A B01.

in vivo in vitro c

I

II

In vitro

in vitro

0,1

(0,7 /),
5,3

(1,2 /) 8

(C_{ssmin}) 1,8
(1,8 /)

(0,4 /).

C_{ssmin} 2,7

ssmax 400
(0,6 /) 4
2,9

200 4-

800 4-
(0,9 /).

-

18 % 40 %

5,7

1

19,5

60 %.

10-15 %

« / »

(9 % 33 %)

50 %

()

Varicella zoster (

).

« / ».

»).

(. «

(. « »).

200 5

0,6-4,1 %

400 5 ()

6- 400 2

2- 200 3 8- 2

12-

800

6-12

6-

400

200

4

4-

a

7

800 5

»).

(10 /)

Varicella zoster (

(

10 /)

200 2

),

800 2

12

2

10-25 /) - 800 3

12-

2

6

800

4

2 6

400

4

5

- 20 /

(800)

4

()

2

) ().

,

: , (« »).

: (),

:

.5

25° .

200	10	,2
400	10	,1

• « ».

,01032, . , . ,139.

®
(HERPEVIR®)

:
: 1 100 %
400 ;
:
- :
200 :
400 :

AT J05A B01.

I II , *in vivo in vitro* ,
I , II ,
- - ,
- - ,

In vitro

In vitro

1,1 (0,7 /),
0,4 /).

C_{ssmin} 2,7
 C_{ssmin} (0,6 /) 4
 C_{ssmin} (0,9)
 C_{ssmin} (0,7 /),
 C_{ssmin} 1,8
400 800 4-

(C_{ssmax}) 200 4-

5,3 (1,2 /) 8 (1,8 /),

2,9

0-15 %

/ »

18 % 40 %

1

19,5

5,7

60 %

50 %

(9 % 33 %)

()

Varicella zoster (

).

200

5

0,6-4,1 %
0,3 /

200 5

4-

5

400

(,)

() ,

4

200

400

2

200 ,

3

8-

2

800 .

6-12

200

4

400

(,)

800 5

4-

7

(,)

»).

(.

(10 /)

200 2

12

), - 800 3
.

12- *Varicella zoster* (10 /) 800 (10-25

2 8
6 800 4 , 2 6 2 400 4
5 -20 / (800) , 4
() ,

2 .

20

) ().

»).

(. «

: , , .
:
:
:
:
: , , , .
:
: (), , , .

:
.5 .

25° .

200 10 ,2
400 10 ,1

« ».

,01032, . , . ,139.