

From:

To:

Date: 7/4/2022 10:24:13 PM

Subject:

Attachments: .thmx

(LAXERS)

:

: cefoperazone, sulbactam;

1

1000 ,

1000 .

:

.

,

-

:

.

.

AT J01DD62.

.

.

.

,

.

-

.

-

.

-

,

.

Neisseriaceae *Acinetobacter*.

,

,

-

,

,

-

.

() : *Haemophilus influenzae*, *Bacteroides*, *Staphylococcus*,
Acinetobacter calcoaceticus, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Morganella morganii*, *Citrobacter freundii*,
Enterobacter cloacae, *Citrobacter diversus*.
in vitro

-
- *Staphylococcus aureus* (,);
 - *Staphylococcus epidermidis*;
 - *Streptococcus pneumoniae* (*Diplococcus pneumonia*);
 - *Streptococcus pyogenes* (-);
 - *Streptococcus agalactiae* (-);
 - - ;
 - *Streptococcus faecalis* ().

-
- *Escherichia coli*;
 - *Klebsiella*;
 - *Enterobacter*;
 - *Citrobacter*;
 - *Haemophilus influenzae*;
 - *Proteus mirabilis*;
 - *Proteus vulgaris*;
 - *Morganella morganii* (*Proteus morganii*);
 - *Providencia rettgeri* (*Proteus rettgeri*);
 - *Providencia*;
 - *Serratia* (*S. marcescens*);
 - *Salmonella* *Shigella*;
 - *Pseudomonas aeruginosa* *Pseudomonas*;
 - *Acinetobacter calcoaceticus*;
 - *Neisseria gonorrhoeae*;
 - *Neisseria meningitidis*;
 - *Bordetella pertussis*;
 - *Yersinia enterocolitica*.

:

- (*Bacteroides fragilis*, *Bacteroides* *Fusobacterium*);
- (*Peptococcus*, *Peptostreptococcus* *Veillonella*);
- (*Clostridium*, *Eubacterium* *Lactobacillus*).

() (/ ,)

	16
	17-63
	64

(, -)

	21
	16-20
	15

, , 30 75 « »
 , « » ,

/ 30 /75

	()
<i>Acinetobacter</i> ATCC 43498	26-32
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	22-28
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	27-33
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	23-30

(Vd = 18,0–27,6) (Vd = 10,2–11,3). 15 4,5 (

1:2) (1,5 +3) 88,3 / 416,1 / 11 / 45,3 / 29,9 / 58,4 / 1,5 (0,5

+ 1) 12 . 84 % 25 % 1 1,5 ,

- 1,7 . 1,5 (0,5 1)

19 64,2 / 15 2 8–12 .

« » .

6,9 9,7).

1,88 0,91 1,42 , - 1,44

(. « »).

— / (. « »).

2-4 .

2 / .

() ()

/

Clostridium difficile,

C. difficile *C. difficile.* *C. difficile,*

C. difficile 2

: 1 2 (1000 /1000)

5,8 (134,14) .

10

(/)

2

2-4 (1

12

	/	()	()	()
1:1	2-4	1-2	1-2	

8 (4 (8⁻⁴),) .

12

« ».

(30 /)

1 , 12 (500 , 12 (- 2),

15-30 / (- 1), 15 /

« ».

20-40 / /), 40 80 / / (2-4 .

	(/ /)	(/ /)	(/ /)
1 : 1	40-80	20-40	20-40

160 / / (80 / /), 2-4 (. « »).

1- 12 . 80 / (160 / /) . 80 / (. « »).

5 % , 0,9 % 20 15-60 .

()	+	()	(/)
2	1 + 1	6,7	125 + 125

« »).

, , , 3 . : , 5 % , 0,9 % , 5 % 0,225 % 5 % 0,9 % .

125 1 10 250 1 . 5

(. « »).

5 / (2 4) ;

25° .

2 %

2 %

1 10

in bulk

,18030,
.: (044) 281-01-01.

,108.