

From:

To:

Date: 6/28/2022 11:29:37 AM

Subject:

Attachments: .thmx

(LIDOCAINE)

1 : lidocain ; () 20 ;
: , , .
- : , .
N01B 02.
(1 % 2 %) (40-50 %). (0,5 %)
(max) 10-20); (, max
5-15 - 60-80 % () , -
90 % (40-55 %) , -
N- :

$$(T_{1/2})^2 \cdot 10$$

« ».

$T_{1/2}$

$$2$$

5-20 %.

(II-III)

(A)

QT,

IA

A -

A -

(. . . , , , , , () ,).

-
-
-
-
« ».

()-

, - ();

, - , - , - , -

QRS

/ P-Q, 0,5-1

(/)

10

)

(, , ,) .

: , , ,

, ,

A -

10 /),

6 /

(, ')

-4,5 /
(. . -2-3 (40-60) (2 %)

2

2 / , - 15-30

300 .
5-10 (100-200)

- 10

(200).

2-3

30-60

12

(1:50000- 1:100000;

3 /
ex tempore,

1 0,1 %

5-10 2 %),

(),

(, , ,)

.
: , A - 0,01 / . - , ; (/), 0,006 / , /

), - (0,5-1

: (, (, « » - / ,

(...), . (1), /));

.3 .

2 ; 5
2 ; 10 ,1 2

« ».

,37500, , , ,16.