

**10**  
(MEM X 10)

**20**  
(MEM X 20)

1 : ;  
: ;  
10 20 ;  
: , , , (E 171), 4000 ( ), 20 :  
(E 172), (E 172).

« 10»: , «M9MN» «10»  
- ;  
« 20»: - , «M9MN 20»  
- .

·  
, · N06D X01.

·  
·  
NMDA- (N- -D- ). NMDA- .

·  
·  
·  
100 %, (t<sub>max</sub>) – 3 8 .

70 150 / (0,5>1 )

5 30  
45%

0,52.

10 / .

80 %

N-3,5-  
3,5-

4- 6-

1-

NMDA-  
84 %

450  
20

*in vitro*  
99 %

<sup>14</sup>C-

$t_{1/2}$

60 100

(Cl<sub>tot</sub>)

170 / 1,73 2.

7-9

10-40

/  
20

$k_1$ (

)

0,5

-  
NMDA-

-  
NMDA-

L-

*invitro*

Y 1 2,2 6,2 9,2D6,2 1,3 ,

(NMDA)-

*Proteusbacteria.*

( IV

1

3

5

4

1- (1-7- ):

5 ;

2- (8-14- ):

10 ;

3- (15-21- ):

15 ;

4- :

20  
20

65 20

( -30-49 / ) ( -50-80 / )

7

10

( 20 -5-29 / )

10

(Child-PughA, B)

(200 105 3 )

140

2000

(10 ),

400

(> 1/1000 < 1/100),

(> 1/10000 < 1/1000),

(< 1/10000),

( : (> 1/10), (> 1/100 < 1/10), ).

		1 2
		/

		2

1

2

.3 .

25° .

. 10: 10 ; 3 6  
20: 10 ; 3 .

. « » ( in bulk , . , ).

,03124, . , ,8.

« » : ,8, . ,03124, / : +38 044 281 2333.