

(MEMBRAL)

1 : ;  
: ;  
: , ; 10 ;  
( 171)). Opadry II White ( , ; ( ; ; ) ; ;

N06D X01.

NMDA (N- -D- )-

NMDA-

100 %,

- 3 8 .

20

70 150 / (0,5-1 )

0,52.

10 / .

5 30  
45 %

NMDA-

N-3,5-

80 %  
450

*in vitro*

1- -3,5-  
t<sub>1/2</sub> 60 100

170 / /1,73 2.

7-9 .

10-40

20

$k_i$  (

)

0,5

( 18 )

NMDA-

NMDA-

L-

( )

( )

*in vitro*

CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A,

N-

-D-

(NMDA)-

(

)

bacteria.

( )

*Proteus*

(III-IV ),

1

20

5

3

- 1- (1-7 ):  $\frac{1}{2}$  (5 ) ;
- 2- (8-14 ): 1 (10 ) ;
- 3- (15-21 ):  $1\frac{1}{2}$  (15 ) ;
- 4- : 2 (20 )

20

3

),

( 5-29 / )

( 10 .

( 30-49 / )

( 50-80 / )

( 18 )

( 200 105 / 3 )

( 2000 )

( 400 )

(

65 20 (2 10 1

10 . 20

( - ' , B)

140

(

, , ;  
 , , , .  
 , ( , ) ,  
 ( ) .  
 / , .  
 ( ) .  
 , , .  
 / ( , ) ,  
 ( ) ,  
 , , .

---

/  
 .3 .

25° .

10 ; 3 .  
 10 ; 6 .

« » .

