

(PAROXIN)

1

Opadry

II White (

N06A B05.

5-

(5- ,).

5-

1-

2-

(D₂), 5-

1-

, 5- 2-

(1-)

64 %

2 %.

36 %

2

1

7-14

1 %

95 %

»).

(QT

2

2

(. «

CYP450 2D6,

»).

, torsades de pointes)

(. «

»).

5-

()

(),

Hypericum perforatum,

L-

()

(. « »).

(2)

CYPD26
QT

(. « »).

(, , ,)

().

().

CYP2D6

CYP2D6

P450.

CYP2D6

)

(,)

(, , , 1 (),

CYP2D6,

(« »).
 () / / ,
 - ,
 /
 /
 ,
 ((L-))
 « » « »).
 /
 -
 ,
 ,
 CYP2D6 (/ «
 CYP2D6.
 ;
 2
 ;
 /

0,1 %.

(-).

(. « »), «

(. « »).

«

»).

1 100.

1 50

4-5

(2)

(<24)

(. «

» « »).

10* (50*)
 - 20
 - 40
 40
 60
 10* 20
 10* 60
 10* 10*
 50* - 20
 - 20
 50* 20
 - 20 50* 20
 50* 10*
 20
 40
 (- 30 /)

*

2000

(1/100,<1/10),

(1/1000, <1/100),

(1/10000, <1/1000),

(<1/10000),

(1/10),

»);

(

).

25° .

10 . ; 3 6 .

•
•
•
« » , .

,03124, . , ,8. •

« » : ,8, . ,03124, / :+38 044 281 2333