**ІНСТРУКЦІЯ**
**для медичного застосування лікарського засобу**

# ВАГІЛАК
# (VAGILAC)

***Склад:***
*діюча речовина:* 1 капсула містить 4 млрд активних клітин (КУО) *Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus*;
*допоміжні речовини*: лактоза, моногідрат; магнію стеарат; кислота аскорбінова;
*оболонка капсули*: желатин.

**Лікарська форма.** Капсули вагінальні.
*Основні фізико-хімічні властивості:* кремові желатинові капсули, які містять білий або кольору слонової кістки порошок, допускається присутність окремих більш темних гранул.

**Фармакотерапевтична група.** Інші засоби, що застосовуються у гінекології.
Код АТХ G02C X.

***Фармакологічні властивості.***
*Фармакодинаміка.*
Лактобактерії, що переважають у складі нормальної вагінальної флори, є природним бар'єром на шляху інфекцій. Ці мікроорганізми сприяють регулюванню вагінального мікробіоценозу шляхом конкурентного зв'язування з епітеліальними клітинами піхви та продукції антимікробних сполук. Родина *Lactobacillaceae* включає грампозитивні, в основному нерухомі мікроорганізми, факультативні анаероби, які не утворюють спор, мають здатність до бродіння, ферментують вуглеводи з утворенням молочної кислоти, яка перешкоджає розмноженню патогенної та умовно-патогенної мікрофлори. Це морфологічно гетерогенна група бактерій, яка включає довгі та короткі палички, а також коки.
Молочнокислий стрептокок створює умови для розвитку молочнокислих паличок, знижуючи окисно-відновний потенціал до величини, сприятливої для їхнього розвитку. Молочнокислі палички в свою чергу виробляють водорозчинну термостабільну сполуку, яка сприяє росту стрептококів і яку вони самі не можуть виробляти. Симбіотичні зв'язки, які існують між молочнокислими паличками та коками, є важливою і необхідною умовою для включення цих мікроорганізмів до складу препарату Вагілак, який використовується для профілактики та лікування вагінальних дисбактеріозів різного походження. Лактобактерії асимілюють глікоген, який знаходиться у клітинах плоского епітелію піхви, та за допомогою анаеробного гліколізу виділяють молочну кислоту, яка зумовлює слабокислу реакцію (pH 4,3–4,7) вагінального вмісту. Завдяки цьому молочнокислі бактерії відіграють важливу роль у збереженні та нормалізації мікробного балансу слизової оболонки піхви, запобігають розвитку патогенної та умовно-патогенної мікрофлори та сприяють самоочищенню піхви від умовно-патогенної флори.
*Фармакокінетика.*
Препарат не всмоктується з піхви, тому не чинить системної дії на організм. Колонізаційна здатність лактобактерій, які входять до складу препарату Вагілак, посилюється за рахунок комбінації з *Streptococcus thermophilus*.

**Клінічні характеристики.**

***Показання.***
Профілактика та лікування у складі комплексної терапії вагінозів різного походження (трихомонадних, бактеріальних, грибкових).

***Протипоказання.***
Підвищена чутливість до препарату або його компонентів в анамнезі. Розповсюджені гострі запальні (гнійні) та ерозивні зміни слизової оболонки піхви.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***
Препарат можна призначати у комплексній терапії разом із антибіотиками, сульфаніламідами, метронідазолом та іншими антибактеріальними препаратами.

***Особливості застосування.***
*Застосування у період вагітності або годування груддю.*
Вагілак можна застосовувати жінкам у період вагітності та годуванні груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*
Вагілак не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

***Спосіб застосування та дози.***
Препарат призначений для вагінального застосування.
*Застосування з метою лікування.*
Для лікування гострих, хронічних, рецидивуючих інфекційно-запальних захворювань органів статевої системи у жінок Вагілак призначають через кілька днів після початку антибактеріальної терапії (на 4−5-й день), а також у разі необхідності після її закінчення. Тривалість використання – 10 днів. По 1 капсулі на ніч. Лежачи, ввести капсулу глибоко у піхву.
*Застосування з метою профілактики.*
З метою профілактики захворювань органів статевої системи у жінок (бактеріального вагінозу, кандидозу, трихомоніазу) Вагілак застосовують з початку другої половини менструального циклу впродовж 5 або 10 днів. Лежачи, ввести капсулу глибоко у піхву. По 1 капсулі на ніч.

***Діти.***
Препарат дітям не застосовують.

***Передозування.***
Неможливе.

***Побічні реакції.***
Можливі реакції гіперчутливості; реакції у місці введення, у тому числі гіперемія та печіння.

***Термін придатності.***
3 роки.

**Умови зберігання.**
Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі від 2 до 8 ºС.

**Упаковка.**
По 10 капсул у флаконі.
**Категорія відпуску.**
Без рецепта.

**Виробник.**
Фармасайнс Інк. / Pharmascience Inc.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек H4P 2T4, Канада/
6111 Royalmount Avenu, 100, Montreal, Quebec H4P 2T4, Canada.