

**(ZOLENDROVISTA)**

5  
1

:  
: zoledronic acid;  
4  
0,8  
(E 421),  
4,264  
( )  
05 08.  
In vivo –  
(  
In vitro –  
10 %  
0,1 %  
4  
< 1 %  
28-  
5- 15- 2, 4, 8 16  
24  
64

3 :

$t_{1/2} = 146$

$t_{1/2} = 0,24$

$t_{1/2} = 1,87$   
28

24

$39 \pm 16 \%$

$5,04 \pm 2,5 /$

5 15

(AUC).

*in vitro*,

450

3 %

$75 \pm 33 \%$

- 37 %

$84 \pm 29 / ( 22-143 / ) 64$

20 / (

) 50 / (

(< 30 / )

72 %

- 60 %

2 /

77 %

2000 /

3 17

( / ).

(

),

(

),

-

450.

*in vitro,*

)

(

2-3

15

4

4

(AIs)

( . « »). , 10 % . , , , . 400 / 4,5 / 265 / 3 / (AIs) ( < 30 / ). )

---

---

- ( ), ( )
  - , ( , , ), .
  - :
  - , ,
- 5 , 5 . , , / - , /

---

---

---

---

---

---

---

---

24,00 /

«

»).

D.

(

(

;

;

),

,

,

,

,

-

,

,

,

,

-

,

,

,

,

.

,

/

,

,

.

.

,

.

,

,

.

,

-

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

4

100 0,9 %

5 %

15

4

3-4

500 400

D

2-3

4

(

12,0 / 3,0 / )

> 4,5 /  
4,5 /

> 400 /  
< 400 / <

> 265 / ( 3 / < 30 / ).

30-60 / ),

:

(

	*
>60	4
50-60	3,5
40-49	3,3
30-39	3

\* AUC=0,66 / ( AUC, 75 / ).

– (< 1,4 / < 124 / )- 0,5 / 44 / ;  
 – (> 1,4 / , > 124 / ) 1 / , 88 / . 10 %

1 17

5 , 4 , 100 0,9 % 5 %

–4,4 3,5 ;  
 –4,1 3,3 ;  
 –3,8 3 .  
 100 0,9 % 5 %

48 , ( .. ) , ( .. ) .

3

4

(< 1/10000),

(

( 1/10),

( 1/100, < 1/10),

( 1/1000, < 1/100),

( 1/10000, < 1/1000),

\_\_\_\_\_ :

- ;  
- , ;  
- .

\_\_\_\_\_ :

- ;  
- , , , , ( , , ; ).  
- , , ,

\_\_\_\_\_ :

- , ;  
- .

\_\_\_\_\_ :

- , ;  
- , ;  
- ;  
- .

\_\_\_\_\_ :

- , , ;  
- , , ,

\_\_\_\_\_ :

- , , ;  
- .

\_\_\_\_\_ :

- , ( ),





( , , , )

( , , , , )

2,5 %

5 , 1,9 %

« ».

3

« »

( , )

.3

24

2-8 °C

0,9 %

5 %

( , 0,9 %

5 % ) ,

5

.

. 1

.

.

.

.

, . . .

.

. /

, nº1,

,

, 08830,

.

22,

, 6545

,

.