

## **ІНСТРУКЦІЯ** **для медичного застосування лікарського засобу**

### **КАЛЕНДУЛИ КВІТКИ**

#### **Склад:**

*діюча речовина:* календули квітки (*calendulae flores*);

1 пачка містить календули квітки (*calendulae flores*) 25 г, 40 г, 50 г;

1 фільтр-пакет містить календули квітки (*calendulae flores*) 1,5 г.

#### **Лікарська форма.** Квітки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* порошкоподібна маса, суміш часток жовто-оранжевого, яскраво-жовтого, блідо-жовтого або червонувато-оранжевого кольору (*фільтр-пакети*).

Суміш подрібнених квітколож, квітконосів, трубчастих та несправжньоаязичкових квіток та листочків обгортки. Колір шматочків квітколож, квітконосів та листочків обгортки сіро-зелений або зелений. Колір квіток від блідо-жовтого до яскраво-жовтого, жовто-оранжевого, жовто-коричневого чи червонувато-оранжевого кольору (*пачки із подрібненою сировиною*).

Цільні або що частково обсіпалися кошики до 5 см у діаметрі без квітконосів або із залишками квітконосів не більше 3 см завдовжки (*пачки з цільною сировиною*).

#### **Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні засоби. Код АТХ R02A A20.

#### **Фармакологічні властивості.**

Календули квітки містять каротиноїди (каротин, лікопін, віолаксантин, цитраксантин, рубіксантин, флавохром), флавоноїди (нарцисин, рамнетин, ізорамнетин-3-триглюкозид, ізокверцитрин), олію ефірну, сапоніни, гірку речовину календен, смолисті і дубильні речовини, слиз, інулін, кислоти органічні (яблучна, саліцилова, пентадецилова), фітостерин, ферменти, вітамін С, алкалоїди. Цей комплекс біологічно активних речовин чинить протизапальну, ранозагоювальну, бактерицидну, спазмолітичну і жовчогінну дію, прискорює процеси регенерації тканин. Препарати із квіток календули при внутрішньому застосуванні сприяють регенерації слизових оболонок шлунка і кишечника, прискорюють загоєння виразок та ерозій, чинять седативну м'яку гіпотензивну дію, сприяють нормалізації серцевої діяльності.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Внутрішньо застосовують при гастритах, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, колітах, ентероколітах, запальних захворюваннях печінки, жовчовивідних шляхів та селезінки, зовнішньо – при захворюваннях ротової порожнини (молочниця у дітей, гінгівіти, піорея, запально-дистрофічна форма пародонтозу), ангінах, тонзилітах – у складі комплексної терапії.

##### **Протипоказання.**

Індивідуальна підвищена чутливість до біологічно активних речовин, що містяться у препараті.

##### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

##### **Особливості застосування.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності або годування груддю Календули квітки призначають тільки тоді, коли очікувана користь для жінки переважає потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

*Цільна сировина:* 1 столову ложку не подрібнених квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по  $\frac{1}{3}$  склянки, дітям віком 12-14 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 десертній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Зовнішньо застосовують для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу.

*Подрібнена сировина:* 1 десертну ложку подрібнених квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по  $\frac{1}{3}$  склянки, діти віком 12-14 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 десертній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу.

*Порошок:* 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по  $\frac{1}{3}$  склянки, дітям віком 12-14 років – по  $\frac{1}{4}$  склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 десертній ложці. Перед застосуванням настій збовтати. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Діти.**

Внутрішньо препарат застосовують дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

**Передозування.**

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

**Побічні реакції.**

При індивідуальній підвищеній чутливості до препарату можливий розвиток алергічних реакцій, включаючи гіперемію, висипання, свербіж та набряк шкіри.

При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 2 роки.**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб.

**Упаковка.**

По 25 г, 40 г, 50 г у пачках з внутрішнім пакетом з цільною сировиною;

по 25 г, 40 г, 50 г у пачках з внутрішнім пакетом з подрібненою сировиною;

по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

АТ «Лубнифарм».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**  
Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.