

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**НУКС ВОМІКА-ГОМАКОРД**  
**(NUX VOMICA-HOMACCORD®)**

**Склад:**

*діючі речовини:* 100 г препарату містять: Bryonia D30 – 0,2 г, Bryonia D200 – 0,2 г, Bryonia D1000 – 0,2 г, Bryonia D2 – 0,2 г, Bryonia D6 – 0,2 г, Bryonia D10 – 0,2 г, Bryonia D15 – 0,2 г, Citrullus colocynthis D3 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D30 – 0,3 г, Citrullus colocynthis D200 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D10 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D30 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D200 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D1000 – 0,3 г, Lycopodium clavatum D3 – 0,3 г, Strychnos nux-vomica D30 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D15 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D10 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D200 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D1000 – 0,2 г, Strychnos nux-vomica D2 – 0,2 г;

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозорий безбарвний розчин із запахом етанолу.

**Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.**

Препарат чинить протизапальну, дезінтоксикаційну, спазмолітичну та жовчогінну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного та мінерального походження, які входять до складу препарату.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Функціональні порушення та запалення з боку шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура та печінки, спастичний запор, виразковий коліт, дивертикуліт, гастрит і дуоденіт (гострий та хронічний), виразка шлунка, дисбіоз кишечника, метеоризм.

**Протипоказання.** Індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

**Особливості застосування.**

На початку лікування лікарським засобом можливе короткочасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити та звернутися за консультацією до лікаря.

У поодиноких випадках гомеопатичне початкове загострення може призвести до тимчасового запаморочення та головного болю, що швидко проходить і не потребує відміни препарату.

Цей лікарський засіб містить 35 об. % етанолу (алкоголю), тобто 138 мг/дозу, що еквівалентно 4 мл пива, 2 мл вина у дозі.

Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні вагітним та жінкам, які годують груддю, дітям та пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Даний лікарський засіб необхідно застосовувати з обережністю під час вагітності та годування груддю. Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально. Дані щодо фертильності відсутні.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Невідома.

#### **Спосіб застосування та дози.**

Разова доза:

діти від 2 до 6 років – по 5 крапель 3 рази на добу;

діти від 6 до 12 років по 7 крапель 3 рази на добу;

дорослі та діти від 12 років по 10 крапель 3 рази на добу до їди або через 1 годину після їди. Краплі розчинити в 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

*У гострих випадках:*

діти від 2 до 6 років – по 5 крапель кожні півгодини, але не більш 8 разів на добу;  
діти від 6 до 12 років – по 7 крапель кожні півгодини, але не більш 8 разів на добу;

Дорослі та діти від 12 років – по 10 крапель кожні півгодини, але не більш 8 разів на добу.

Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті. Якщо симптоми зберігаються більш ніж 7 днів або спостерігається погіршення стану необхідно припинити лікування та звернутися за консультацією до лікаря.

Тривалість застосування лікарського засобу залежить від ступеня тяжкості та перебігу захворювання визначається лікарем індивідуально.

*Діти.*

Препарат рекомендований для застосування дітям від 2 років.

#### **Передозування.**

Не відзначалося.

#### **Побічні реакції.**

В осіб з підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату можливі такі алергічні реакції, як кропив'янка, свербіж.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

#### **Умови зберігання.**

Спеціальних умов зберігання не потребує.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 30 мл.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.