

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

РОСТ-NORMA
(ROST-NORMA)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Calcium carbonicum 30CH 20 мг, Calcium carbonicum 1000CH 20 мг, Calcium phosphoricum 1000CH 20 мг, Calcium fluoricum 500CH 20 мг,

Silicea 1000CH 20 мг;

допоміжні речовини: крупка цукрова.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження заявника. ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

04050, Україна, м. Київ, вул. Тургеневська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

37500, Україна, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості препарату зумовлені поєднанням дії компонентів, що входять до складу препарату. Регулює мінеральний обмін, сприяє нормалізації росту і репарації кісткової тканини; зміцнює зв'язковий апарат суглобів, прискорює загоєння хірургічних ран, має протиалергічну дію; нормалізує діяльність травного тракту, сприяє нормалізації кишкової флори; має імуномодулюючу та протизапальну дію.

Показання для застосування.

У складі комплексної терапії:

лікування і профілактика порушень фосфорно-кальцієвого обміну (рахіту, сколіозу, карієсу), особливо у періоди інтенсивного росту; профілактика системного остеопорозу в осіб з підвищеним ризиком його розвитку; у реабілітаційний період переломів кісток, операцій на кісткових тканинах, при остеомієліті; імунодефіцитні стани у дітей.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Гранули необхідно приймати під язик за 15-30 хвилин до або через 1-1,5 години після їди. При необхідності гранули можна попередньо розчинити у невеликій кількості води.

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини – крупки цукрової – хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату слід проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Жінкам у період вагітності або годування груддю перед застосуванням препарату необхідно проконсультуватися з лікарем, який має оцінити співвідношення користі для матері та потенційного ризику для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти. Препарат не призначають дітям віком до 1 року.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначається у комплексній терапії як додатковий засіб при порушеннях фосфорно-кальцієвого обміну – 3 рази на тиждень, курсами від 3 до 6 місяців, залежно від тяжкості стану.

Після травм, операцій, для лікування остеомієліту – 3 рази на добу, протягом 10-14 днів, при переломах кісток – до утворення кісткової мозолі.

Для підготовки до операції – 3 рази на добу, протягом 8-10 днів.

Дорослим та дітям застосовувати по 5 гранул під язик.

Передозування.

У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але у осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти.

У осіб з підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату у поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можливе сполучення з будь-якими методами лікування і лікарськими засобами (у тому числі антибіотиками, протизапальними засобами, вітамінами).

Інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка.

По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній пащці.

Категорія відпуску. Без рецепта.