

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ХОМВІОКОРИН®-N
(HOMVIOCORIN®-N)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини:

10 мл розчину містять:		
Adonis vernalis Ø	(горицвіту весняного Ø)	0,2 мл,
Scilla Ø	(морської цибулі Ø)	0,3 мл,
Solidago virgaurea Ø	(золотушника звичайного Ø)	2 мл,
Convallaria majalis Ø	(конвалії травневої Ø)	6,25 мл,
Crataegus Ø	(глоду Ø)	1,25 мл;

допоміжна речовина: етанол 63%.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Коричневий розчин зі специфічним запахом спирту та гіркуватим смаком прозорий, можливий невеликий фільтрований осад.

Назва і місцезнаходження виробника. Сінтера Др. Фрідріхе ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина.

Дамштрассе 7, Д-59821, Арнсберг, Німеччина Synthera Dr. Friedrichs GmbH and Co. KG, Germany. Dammstrasse 7, D-59821, Arnsberg, Germany.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат. Лікарський засіб для лікування хронічної серцевої недостатності.

Містить серцеві глікозиди рослинного походження: горицвіт весняний – глікозиди типу карденолідів – строфантин; конвалія травнева – конвалітоксин; морська цибуля – типу буфадієнолідів – просциларидин-А, сциларен-А. Максимальна денна доза Хомвіокорин®-N містить максимально 0,9 мг серцевих глікозидів.

Кардіотонічний ефект обумовлений позитивним інотропним ефектом за рахунок блокади KNa^+ – АТФази і зміни внутрішньоклітинної концентрації іонів Ca^{++} , прямої дії на скоротливі білки (актин-міозин) кардіоміоцитів.

Негативний хронотропний ефект обумовлений пригніченням автоматизму синусового вузла.

Позитивний батмотропний ефект мінімально виражений за рахунок малих доз серцевих глікозидів морської цибулі.

Діуретичний та натрійуретичний ефекти обумовлені покращенням ниркової гемодинаміки і видільної функції нирок за рахунок зниження реабсорбції у каналцях та виділення натрію (вищезазначені глікозиди і золотушник звичайний).

Мембраностабілізуючий і антиоксидантний ефекти досягаються завдяки вмісту глоду.

Показання для застосування.

В комплексному лікуванні хронічної серцевої недостатності (I-II функціональний клас).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату хронічний алкоголізм (у зв'язку із вмістом спирту), виражена артеріальна гіпотензія, виражена брадикардія, дитячий вік до 12 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Препарат містить спирт. Після прийому першої дози препарату можливе короткочасне загострення основних симптомів (гомеопатичний ефект першої дози). У такому випадку необхідно тимчасово зменшити частоту прийому або дозу препарату. Перші ознаки поліпшення стану з'являються через 1 тиждень від початку лікування.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Даних щодо безпеки застосування під час вагітності та годування груддю недостатньо, тому під час вагітності та годування груддю препарат можна застосовувати тільки після консультації з лікарем, з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для плода.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. У рекомендованих дозах не впливає на швидкість психомоторних реакцій при керуванні автотранспортом та роботі зі складними механізмами.

Діти. Дозволено застосування препарату дітям віком від 12 років.

Спосіб застосування та дози. При хронічному перебігу захворювання початкова доза для дорослих та дітей віком від 12 років становить 10-20 крапель 1-3 рази на добу. Для досягнення ефекту дозу можна збільшити до 30 крапель 3 рази на добу. Тривалість терапії визначають індивідуально, але вона повинна становити не менше 2-3 місяців. Після 2-3 місяців застосування переходять на підтримуючу дозу - 10 крапель один раз на день або через день протягом тривалого часу.

Краплі приймають за 30 хв до або через 30 хв після їди на шматочку цукру або хліба, повільно їх розсмоктуючи, або з ковтком води, утримуючи його у роті якнайдовше.

Передозування. Застосування великої кількості препарату може спричинити отруєння алкоголем. Прийом усього вмісту 1 флакона (50 мл) дорівнює введенню в організм 22 г спирту.

Побічні ефекти. Можливі реакції підвищеної чутливості до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами невідомі. Можна застосовувати у комбінації з діуретиками, інгібіторами АПФ, периферичними вазодилататорами, блокаторами β -адренорецепторів. Може посилювати дію снодійних, седативних, антигіпертензивних засобів, антиаритмічних препаратів. Не призначати разом із серцевими глікозидами. Паління, вживання алкоголю і тонізуючих напоїв (чай, кава) можуть послабляти дію гомеопатичних засобів.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

Упаковка. По 50 мл у флаконах з крапельницею №1 у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.