

ІНСТРУКЦІЯ **для медичного застосування препарату** **ФУКОРЦИН**

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: фуксин основний, кислота борна, фенол, ацетон, резорцин;
1 мл розчину містить: фуксину основного 0,004 г, кислоти борної 0,008 г, фенолу 0,039 г, ацетону 0,049 мл, резорцину 0,078 г;
допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування.

Рідина темно-червоного кольору з характерним запахом фенолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

Державне підприємство “Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України”.
Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15а.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Код АТС D08A X10**.

Активні діючі речовини, що входять до складу препарату, забезпечують широкий спектр протимікробних ефектів при ураженнях шкіри інфекційними збудниками. Препарат проявляє також фунгіцидний ефект при грибкових ураженнях зовнішніх покривів.

Показання для застосування.

Лікування захворювань шкіри, спричинених чутливими до компонентів препарату збудниками: різні види дерматоміцетів (трихофітони, мікроспориуми, епідермофітони), мікробна екзема, жирна та змішана форми себореї.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років. Вагітність, період годування груддю. Хронічні алергічні дерматози.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Лікування препаратом слід проводити під контролем лікаря та дотримуватись рекомендованих доз.

Не допускати потрапляння препарату в очі та не наносити на слизові оболонки.

Хворим з порушеною функцією нирок перед застосуванням препарату необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати жінкам під час вагітності або у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Впливу на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами не виявлено.

Діти.

Препарат не застосовують дітям до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Розчином змазують уражені ділянки шкіри від 1 до 3 разів на добу до зникнення симптомів захворювання. Тривалість курсу лікування визначає лікар.

Передозування.

При тривалому застосуванні препарату та використанні його на великих ділянках шкіри можливе виникнення явищ, характерних для отруєння фенолом (запаморочення, слабкість, розлади дихання, колапс). У разі виникнення таких явищ необхідно дати хворому доступ свіжого повітря, змити препарат водою зі шкірних покривів та провести симптоматичне лікування.

При передозуванні можливе посилення побічних ефектів, алергічних реакцій.

Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливе короточасне відчуття печії та болю.

При тривалому застосуванні препарату можливий розвиток дерматитів та місцевих алергічних реакцій.

При резорбтивній дії можуть виникати явища запаморочення, слабкості, розлади дихання, нудота, блювання, головний біль, діарея.

При появі таких симптомів необхідно змити залишки препарату з поверхні шкіри водою; відмінити препарат та призначити симптоматичну терапію.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Слід уникати одночасного застосування протигрибкових антибіотиків місцевого застосування, таких як гризеофульвін, клотримазол, препаратів, до складу яких входить фенол, борна кислота, а також гормональних препаратів. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть виникати алергічні реакції.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Термін придатності. 2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 15 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.