

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ШИПШИНИ ПЛОДИ

(ROSAE FRUCTUS)

Склад:

діюча речовина: шипшини плоди (*Rosae fructus*);

1 пачка містить: шипшини плодів (*Rosae fructus*) 100 г або 130 г;

1 фільтр-пакет містить: шипшини плодів (*Rosae fructus*) 3 г.

Лікарська форма. Плоди.

Основні фізико-хімічні властивості:

цільна сировина: цілісні, очищені від чашолистиків і плодоніжок несправжні плоди різної форми оранжево-червоного, червоного, бордового, темно-бордового, бурувато-червоного кольору;

подрібнена сировина: суміш неоднорідних шматочків оболонки плодів, цілих горішків або їх шматочків. Колір шматочків плодів зовні оранжево-червоний, червоний, бордовий, темно-бордовий, бурувато-червоний, внутрішня поверхня – жовта, оранжева, оранжево-червона, червона, бордова, темно-бордова, бурувато-червона; волоски – світло-жовті, жовті, світло-оранжеві, оранжеві; горішки світло-жовті, іноді буруваті.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що діють на метаболізм та систему травлення.

Код АТХ А16А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини плодів чинять антисклеротичну, протизапальну дію; активізують ферментні системи та окисно-відновні процеси в організмі, сприяють усуненню дефіциту вітаміну С, нормалізують вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів і регенерацію тканин, підвищують опірність організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищують секрецію жовчі, збільшують діурез, зменшують ламкість і проникність капілярів.

Клінічні характеристики.

Показання.

Загальноозміцнювальний засіб при гострих та хронічних інфекціях, дистрофії, фізичних навантаженнях; геморагічні діатези; кровотечі різної етіології; передозування антикоагулянтів; гострі та хронічні захворювання печінки (хронічний гепатит, холецистит, холангіт); захворювання нирок і сечового міхура (нефрити, нефропатії у вагітних) – у складі комплексної терапії.

Противоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Тромбофлебіт і схильність до нього, недостатність кровообігу, ендокардит, декомпенсований цукровий діабет, тяжкі хвороби нирок, жовчокам'яна хвороба.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Після застосування настою рекомендоване полоскання ротової порожнини теплою водою або слабким розчином соди для попередження пошкодження зубної емалі.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосовувати після консультації лікаря, який повинен оцінити співвідношення користі/ризиків для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45-60 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½ склянки, дітям віком 10-14 років – по ¼ склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці, 1-3 роки – по 1 десертній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залили 200 мл окропу, закрити і настоювати 20-30 хв. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½ склянки, дітям віком 10-14 років – по ¼ склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці, 1-3 роки – по 1 десертній ложці.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 1 року.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 г або по 130 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 3 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місце знаходження заявника та/або представника заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.