

# ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

## СПИРТ МУРАШИНИЙ

### **Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* мурашина кислота;

100 мл препарату містять мурашиної кислоти 1,4 г;

*допоміжна речовина:* 70 % етанол.

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Прозора, безбарвна рідина із специфічним різким запахом.

### **Назва і місцезнаходження виробника.**

ПАТ «Фітофарм».

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

### **Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТС M02A X10.

Спирт мурашиний відноситься до засобів, що подразнюють чутливі нервові закінчення. Внаслідок стимуляції рецепторів шкіри і підшкірних тканин препарат виявляє не тільки рефлекторний, а й загальний гуморальний вплив. Подразнення Спиртом мурашиним рецепторів супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення ендорфінів, динорфінів, пептидів, що відіграють важливу роль в регуляції больових відчуттів, проникності судин та інших процесів.

### **Показання для застосування.**

Невралгії, міозити, артралгії.

### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Екземи, запальні та інфекційні захворювання шкіри, локалізовані в ділянці його застосування, а також алергічні захворювання.

### **Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Запобігати потрапляння препарату на слизові оболонки та в очі.

### **Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.*

Не впливає.

### *Діти.*

Не застосовують дітям віком до 12 років.

### **Спосіб застосування та дози.**

Спирт мурашиний застосовують зовнішньо для розтирання ураженої ділянки тіла. Кратність застосування препарату і тривалість курсу визначаються характером і вираженістю захворювання.

**Передозування.**

Не спостерігалось.

**Побічні ефекти.**

Можливі сильне подразнення шкіри, висипи, утворення пухирів.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами, що містять органічні сполуки, можуть утворюватися нові сполуки, денатурація білкових компонентів.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 50 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.