

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

**ОСТЕОБІОС**  
**(OSTEOBIOS)**

Склад лікарського засобу:

*діючі речовини:* 100 мл крапель для перорального застосування містять: Os suis D10 – 5,5 мл; Os suis D30 – 5,5 мл; Os suis D200 – 5,5 мл; Glandula parathyroidea suis D10 – 6 мл; Glandula parathyroidea suis D30 – 6 мл; Glandula parathyroidea suis D200 – 6 мл; Calcium carbonicum D12 – 6 мл; Calcium carbonicum D30 – 6 мл; Calcium carbonicum D200 – 6 мл; Calcium phosphoricum D12 – 6 мл; Calcium phosphoricum D30 – 6 мл; Calcium phosphoricum D200 – 6 мл; Calcium fluoratum D12 – 6 мл; Calcium fluoratum D30 – 6 мл; Calcium fluoratum D200 – 6 мл; Master aminoacid pattern D3 – 5,5 мл; Calcitonin D6 – 6 мл;

*допоміжні речовини:* етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 30 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 36 крапель.

**Лікарська форма.** Краплі для перорального застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозорий, безбарвний розчин із запахом спирту етилового.

**Фармакотерапевтична група.**

Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.**

Препарат нормалізує в кістках мінеральний обмін (фосфору, магнію, кальцію), збалансовує функціональну активність остеокластів та остеобластів, припиняє вивимання кальцію із кісток, поліпшує гістологічну структуру кісткової тканини, стимулює синтез білкових компонентів кісткової тканини.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

При комплексному лікуванні остеопорозу у дорослих і дітей віком від 12 років.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Взаємодія поки що невідома.

**Особливості застосування.**

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування, дозу та частоту прийому.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально з урахуванням співвідношення користь/ризик.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

У рекомендованих дозах не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – по 10-20 крапель. Приймати 3 рази на добу, за 30хвилин до їди або через 1 годину після. Краплі розчинити у 10-15 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

Курс лікування – 1-2 місяці.

**Діти.**

Не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

**Передозування.**

У випадку передозування терапія симптоматична.

**Побічні реакції.**

Небажані впливи невідомі. Можливі реакції гіперчутливості. У випадку появи будь-яких незвичних реакцій хворому слід порадитися з лікарем.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі-крапельниці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

**Упаковка.**

По 30 мл крапель у флаконі-крапельниці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

Гуна С.п.а.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Віа Пальманова, 69 - 20132 Мілан, Італія.