

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЛИМОННИКА НАСІННЯ НАСТОЙКА
(TINCTURA SEMINUM SCHISANDRAE)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: лимонника китайського насіння настойка (Schisandrae chinensisidis seminum tinctura) (1:5) (екстрагент – етанол 95 %) 50 мл;

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина від жовто-лимонного до оранжевого кольору. При зберіганні допускається наявність осаду і маслянистих крапель.

Назва і місцезнаходження виробника.

Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація», Фармацевтична фабрика.

Україна, 91020, м. Луганськ, Степовий тупик, 2.

Фармакотерапевтична група. Тонізуючі засоби. Код АТС А13А.

Лікарський засіб, що діє на центральну нервову систему, належить до групи так званих тонізуючих адаптогенних лікарських засобів. Препарат підвищує артеріальний тиск, зменшує частоту серцевих скорочень та підвищує їх амплітуду, збуджує дихання, чинить помітну судинорозширювальну дію в умовах ізольованих органів. Після застосування препарату підвищується рухова активність та рефлекторна збудливість. Відзначається помітний антиснодійний ефект препарату на тлі застосування різних снодійних засобів. Препарати лимонника підвищують рівень спінальних рефлексів, покращують нервово-м'язову провідність. Значно підвищується гострота зору, зменшується стомлення зорового аналізатора при великих навантаженнях, значно покращується нічний зір. При фізичній та розумовій перевтомі істотно підвищується працездатність. Дія препарату настає через 30-40 хвилин і триває 4-6 годин.

Показання для застосування.

Симптоматична терапія фізичної та розумової перевтоми, сонливості, у складі комплексної терапії астеничних та астенодепресивних станів, психостеній, реактивних депресій, які супроводжуються такими симптомами, як швидка втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість, млявість, сонливість, артеріальна гіпотензія.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату, підвищена збудливість, безсоння, артеріальна гіпертензія, порушення серцевої діяльності, епілепсія, хронічні захворювання печінки, гострі інфекційні захворювання, виразкова хвороба шлунка з підвищеною кислотністю у стадії загострення.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить спирт. Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу. Препарат не слід приймати у другій половині дня.

Плоди лимонника китайського можуть підвищувати секрецію шлункового соку, що слід враховувати при гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, гастроєзофагеальній рефлюксній хворобі.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Досвід застосування відсутній.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Слід утримуватися від керування автомобілем або роботи з іншими механізмами на період лікування препаратом.

Діти. Досвід застосування дітям відсутній.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують перорально. Дорослим призначають по 20-25 крапель 1-3 рази на добу за 15-30 хвилин до їди. Курс лікування – 20-25 днів. При необхідності можна провести повторні курси лікування (після консультації з лікарем).

Перед застосуванням настойку слід збовтувати.

Передозування.

Можливе перебудження нервової та серцево-судинної системи. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі збудження, підвищення артеріального тиску, тахікардія, головний біль, безсоння, печія, зміна кислотності шлунка, біль у животі, анорексія, алергічні реакції (у тому числі висипання, кропив'янка).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат є антагоністом снодійних, седативних засобів, транквілізаторів, нейролептиків, посилює дію психостимуляторів та аналептиків (у т.ч. кофеїну, камфори, фенаміну). Одночасне застосування разом із вазоконстрикторами або симпатоміметиками, такими як ефінефрин, ефедрин, метоксамін та фенілефрин може спричинити підвищення артеріального тиску.

Термін придатності. 4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

При зберіганні допускається наявність осаду і маслянистих крапель.

Упаковка. По 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.