

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕЛЕУТЕРОКОК

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить екстракту кореневищ із коренями елеутерококу колючого (*Rhizoma cum radicibus Eleutherococci*) (0,7:1) (екстрагент – етанол 40 %) – 30 мл або 50 мл;

Лікарська форма. Екстракт рідкий для перорального застосування, спиртовий.

Рідина темно-коричнево-жовтого кольору, у тонкому шарі прозора, зі специфічним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Свразія».

Україна, 38600, Полтавська обл., смт. Котельва, вул. Чапаєва, 32.

Фармакотерапевтична група. Тонізуючі засоби. Код АТС А13А.

До складу кореневищ з коренями входять елеутерозиди А, В, В₁, С, Д, Е, F і G, похідні кумарину, флавоноїди, ефірна олія, рослинний віск, смоли, крохмаль. Завдяки наявності елеутерозидів препарат підвищує фізичну та розумову працездатність, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищує гостроту зору, стимулює серцево-судинну систему, послаблює стресові реакції, має деяку стимулюючу, гонадотропну та гіпоглікемічну дію. Препарат добре всмоктується у травному тракті, виводиться з організму головним чином нирками.

Показання для застосування.

Фізична та розумова перевтома, неврастєнії і психостєнії, артеріальна гіпотєнзія, функціональне виснаження центральної нервової системи, яке супроводжується зниженням працездатності, дратівливістю і безсонням.

У складі комплексної терапії при вегетонєврозах, після тяжких хірургічних операцій, при гострій та хронічній променевої хворобі.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гіпертермічний синдром, артеріальна гіпертензія, підвищена збудливість, гострі інфекційні захворювання, інфаркт міокарда, аритмії, безсоння, нейроциркуляторна дистонія, гарячка, епілепсія.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При прийомі препарату необхідно контролювати артеріальний тиск.

Препарат може спричинити безсоння. Тому особам, на яких препарат діє таким чином, його не слід приймати ввечері.

Перед застосуванням збовтувати.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат містить етанол 40 %, тому під час застосування препарату слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами та роботі з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Дітям віком до 12 років препарат не застосовувати.

Спосіб застосування та дози.

Препарат призначати внутрішньо за 30 хвилин до їди. Дорослим приймати по

20-40 крапель 2-3 рази на добу, дітям віком від 12 років призначати з розрахунку 1 крапля на рік життя дитини 2 рази на добу. Курс лікування – 25-30 днів; при необхідності повторити через 1-2 тижні.

Передозування.

Симптоми: можливе підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, підвищена збудливість, порушення сну.

Лікування. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

З боку нервової системи: безсоння, підвищена збудливість, головний біль.

З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску, порушення ритму серця, тахікардія.

З боку алергічних реакцій: висипання, почервоніння шкіри, свербіж.

Тривале застосування може спричинити м'язовий спазм, порушення з боку травного тракту.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат посилює дію стимуляторів центральної нервової системи та аналептиків, є фізіологічним антагоністом засобів, що пригнічують центральну нервову систему (у тому числі барбітуратів, транквілізаторів, протиепілептичних засобів).

Екстракт елеутерококу може потенціювати дію гіпоглікемічних засобів.

Термін придатності. 4 роки.

Препарат не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище + 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 30 мл або 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.