

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЦЕФАГІЛ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: Turnera diffusa Ø ;

1 таблетка містить Turnera diffusa Ø 25 мг;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, білого кольору зі світло-коричневими вкрапленнями.

Назва і місцезнаходження виробника.

Цефак КГ, Остбанхофштрассе 15, 87437 Кемптен, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат.

Компоненти препарату покращують активність сексуальних рефлексів у люмбальній ділянці, сприяють нормалізації кровообігу у ділянці статевих органів, чинять стимулюючу дію на центральну нервову систему і підвищують лібідо як у чоловіків, так і у жінок.

Показання для застосування.

Препарат застосовують при порушеннях сексуальних функцій у чоловіків та жінок відповідно до принципів гомеопатичного лікування.

Протипоказання. Гіперчутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

У випадку появи постійних, неясних або рецидивуючих симптомів слід звернутися до лікаря, оскільки першопричиною вищевказаних симптомів може бути серйозне захворювання, для діагностування якого необхідно пройти медичне обстеження.

На початку лікування гомеопатичним препаратом симптоми наявного захворювання можуть тимчасово посилитися (первинна агравация), що, як правило, не шкідливо і не потребує відміни препарату.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю Цефагіл слід приймати тільки після консультації з лікарем з урахуванням співвідношення користь-ризик, оскільки немає досить обґрунтованих даних щодо прийому препарату в цей період.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат не застосовують дітям.

Спосіб застосування та дози.

Таблетки Цефагіл необхідно розжувати або проковтнути з невеликою кількістю рідини.

Слід приймати по 1 таблетці щопівгодини або щогодини, але не більше 12 разів на добу.

При хронічних порушеннях приймати по 1 таблетці 1-3 рази на добу.

У разі пропуску прийому препарату слід продовжити звичайний прийом, не приймаючи подвійну дозу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Прийом великої кількості препарату може призвести до шлунково-кишкових розладів або викликати послаблювальний ефект у хворих з непереносимістю лактози.

Побічні ефекти. Не виявлені. Можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома. На ефект гомеопатичного лікарського засобу можуть негативно впливати шкідливі фактори способу життя пацієнта та прийом стимулюючих препаратів. У разі прийому будь-яких препаратів слід проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Спеціальних умов зберігання не потребує.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 таблеток у блістері з ПВХ/ПВДХ білого кольору та фольги алюмінієвої; по 5 блістерів у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.