

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН**  
**(LUGOLI SOLUTIO)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 г розчину містить йоду 10 мг, калію йодиду 20 мг;

*допоміжні речовини:* гліцерин, вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин.

Прозора сиропоподібна рідина червоно-бурого кольору із запахом йоду.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район,  
будинок 5.

вул. Лермонтовська,

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.

Код АТСR02A A20.

Люголя розчин чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на гармпозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вільгартний протей.

**Показання для застосування.**

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок, виражена гіперфункція щитовидної залози, декомпенсована серцева, ниркова або печінкова недостатність; дослідження або терапія радіоактивним йодом (за 2 тижні перед та після дослідження або терапії).

**Належні заходи з безпеки при застосуванні.**

Препарат не призначений для прийому внутрішньо. Не слід вдихати та/або проковтувати препарат. Не допускати потрапляння препарату в очі. З обережністю застосовувати при ларингіті через можливість ларингоспазму; при туберкульозі, геморагічних діатезах.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Протипоказано.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не виявлена.

*Діти.* Не застосовувати дітям до 5 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим препаратом, змастити уражені слизові оболонки глотки та гортані 3-4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

**Передозування.**

Можлива поява йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слезотеча, слиновиділення, висипання, м'язова слабкість, загальмованість).

*Лікування.* Негайне припинення застосування препарату та симптоматична терапія.

**Побічні ефекти.**

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слинотеча, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

**Термін придатності.** 3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 25 г у флаконах або по 25 г у флаконі в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН**  
**(LUGOLI SOLUTIO)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 г розчину містить йоду 10 мг, калію йодиду 20 мг;

*допоміжні речовини:* гліцерин, вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин.

Прозора сиропоподібна рідина червоно-бурого кольору із запахом йоду.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка,  
б. 4.

вул. Корольова,

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.

Код АТСR02A A20.

Люголя розчин чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на гармпозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсіели, вульгарний протей.

**Показання для застосування.**

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок, виражена гіперфункція щитовидної залози, декомпенсована серцева, ниркова або печінкова недостатність; дослідження або терапія радіоактивним йодом (за 2 тижні перед та після дослідження або терапії).

**Належні заходи з безпеки при застосуванні.**

Препарат не призначений для прийому внутрішньо. Не слід вдихати та/або проковтувати препарат. Не допускати потрапляння препарату в очі. З обережністю застосовувати при ларингіті через можливість ларингоспазму; при туберкульозі, геморагічних діатезах.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Протипоказано.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не виявлена.

*Діти.* Не застосовувати дітям до 5 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим препаратом, змастити уражені слизові оболонки глотки та гортані 3-4 рази на добу. Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

**Передозування.**

Можлива поява йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слиновиділення, висипання, м'язова слабкість, загальмованість).

*Лікування.* негайне припинення застосування препарату та симптоматична терапія.

**Побічні ефекти.**

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъзотеча, слинотеча, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

**Термін придатності.** 3 роки.

*Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 25 г у флаконах або по 25 г у флаконі в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.