

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЦЕЛЬ Т**  
**(ZEEL T)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** таблетки круглі, плоскі, з фаскою, від білого до біло-жовтого кольору, без запаху;  
**склад:** 1 таблетка містить: Cartilago suis D4 – 0,3 мг, Funiculus umbilicalis suis D4 – 0,3 мг, Embryo suis D4 – 0,3 мг, Placenta suis D4 – 0,3 мг, Rhus toxicodendron D2 – 0,54 мг, Arnica montana D1 – 0,6 мг, Solanum dulcamara D2 – 0,15 мг, Symphytum officinale D8 – 0,15 мг, Sanguinaria c anadensis D3 – 0,45 мг, Sulfur D6 – 0,54 мг, Nadidum D6 – 0,03 мг, Coenzymum A D6 – 0,03 мг, Natrium diethyloxalaceticum D 6 – 0,03 мг, Acidum alpha-liponicum D6 – 0,03 мг, Acidum silicicum D6 – 3 мг;  
**допоміжні речовини:** магнію стеарат, лактоза.

**Форма випуску.** Таблетки під'язикові.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.** *Фармакодинаміка.* Препарат має протизапальну, аналгетичну, хондропротекторну, регенеруючу дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.  
*Фармакокінетика.* Для гомеопатичних препаратів не визначається.

**Показання для застосування.** Артрози (деформуючий остеоартроз, гонартрози, поліартрози, спондилоартрози), хондропатії, плече-лопатковий періартрит, тендопатії, ревматичний поліартрит.

**Спосіб застосування та дози.** Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 таблетка сублінгвально (під язик).  
Приймати 3 – 5 разів на добу за 15 – 20 хвилин до їди або через годину після.  
Курс лікування – 2 – 4 тижні. Можна повторювати курс лікування декілька разів на рік з інтервалами між курсами не менше одного місяця.

**Побічна дія.** Препарат звичайно добре переноситься, але в деяких випадках можливий прояв підвищеної чутливості до компонентів препарату у вигляді алергічної реакції шкіри.

**Протипоказання.** Вагітність, лактація, дитячий вік до 6 років, індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Передозування.** Не відзначалось.

**Особливості застосування.** З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану можна змінювати тривалість курсу лікування та частоту прийому.  
Питання про доцільність застосування препарату при непереносимості лактози вирішується індивідуально.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Препарат сумісний з іншими лікарськими засобами. Якщо застосовуються лікарські засоби з вираженою гепатотоксичною дією, питання про одночасний прийом з препаратом ЦЕЛЬ Т вирішується індивідуально.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати у зовнішній картонній пачці при температурі від 15 °С до 25 °С.

**Зберігати в місцях, недоступних для дітей!**

Термін придатності – 5 років.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** 50 таблеток у поліпропіленовому контейнері, в картонній пачці.

**Назва фірми-виробника.** Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ.

**Адреса.** Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.