

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить суміш м'ятної олії та настоянки листя м'яти перцевої (1 : 10) 25 мл ;

допоміжна речовина: етанол 90 %.

Лікарська форма. Настоянка.

Прозора рідина зеленого кольору із запахом м'яти перцевої. При зберіганні допускається наявність осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

Комунальне підприємство “Луганська обласна “Фармація”, Фармацевтична фабрика.
Україна, 91020, м. Луганськ, Степовий тупик, 2.

Фармакотерапевтична група.

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТС А04 АД20**.

Олія м'яти перцевої (містить до 70 % ментолу та його ефірів) та інші біологічно активні речовини, що містяться в листі м'яти перцевої (кетон-ментон, олеанолова та урсолова кислоти, флавоноїдні глікозиди), стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлекторним шляхом зменшують відчуття нудоти і запобігають блюванню, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

Показання для застосування.

Нудота, блювання, розлади травлення, стенокардія, невралгічні болі.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Бронхіальна астма і спазмофілія. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Відсутні.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

М'яти перцевої настоянка містить спирт етиловий, тому препарат не застосовують у період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Через вміст у препараті спирту етилового слід утриматись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Діти.

Не рекомендується застосовувати М'яти перцевої настоянку дітям віком до 12 років, оскільки до складу препарату входить спирт етиловий.

Спосіб застосування та дози.

Препарат приймають внутрішньо до їди. Дорослим і дітям старше 12 років призначають по 10 - 15 крапель настоянки 3 - 4 рази на день.

Тривалість лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання та індивідуальної чутливості до препарату.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (почервоніння шкіри, висипи, свербіж).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не виявлена.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.