

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЛИСТЯ
(FOLIA MENTHAE PIPERITAE)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: м'яти перцевої листя.

Лікарська форма. Листя.

Подрібнена сировина: шматочки листків різної форми, з домішкою квіток та бутонів. Край листка пилчастий з нерівними гострими зубцями; поверхня гола, тільки знизу по жилках під лупою помітні рідкі, притиснуті волоски і по всій поверхні листка – блискучі золотисто-жовті або більш темні залозки. Колір листків від світло-зеленого до темно - зеленого. Запах сильний, ароматний. Смак трохи пекучий, холодячий.

Порошок крупний: шматочки листків різної форми, з домішкою квіток та бутонів, що проходять крізь сито з діаметром отворів 2 мм. Край листка пилчастий з нерівними гострими зубцями; поверхня гола, тільки знизу по жилках під лупою помітні рідкі, притиснуті волоски і по всій поверхні листка – блискучі золотисто-жовті або більш темні залозки. Колір листків від світло-зеленого до темно-зеленого. Запах сильний, ароматний. Смак трохи пекучий, холодячий.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола".

Україна, 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.

Фармакотерапевтична група. Протиблювальні засоби і препарати, що усувають нудоту. Код АТС А04А Д.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, седативну і слабку гіпотензивну дію; підвищують секрецію травних залоз, збуджують апетит, пригнічують процеси гниття і бродіння у травному каналі, знижують тonus гладеньких м'язів кишечника, жовчо- та сечовивідних шляхів, посилюють виділення жовчі.

Показання для застосування.

Захворювання травного тракту (нудота різного походження, кишкові коліки, метеоризм, спазми травного тракту); захворювання печінки (холецистит, гепатит, холангіт, жовчокам'яна хвороба), як легкий заспокійливий засіб (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Спазмофілія, круп, бронхіальна астма.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Пацієнтам з шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування листя м'яти перцевої, оскільки може збільшитися печія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям старше 3 років.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу за 15 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/2-1/3 склянки, дітям 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 15 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1 склянці, дітям 12-14 років – по 1/2 склянки, 7-12 років – по 1/3 склянки, 3-7 років по 2 столові ложки.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пакках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах у упаковці №20.

Категорія відпуску. Без рецепта.