

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МІКОСЕПТИН®

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить кислоти ундециленової 0,05 г, цинку ундециленату 0,2 г;
допоміжні речовини: кислота стеаринова, віск білий, парафін, олія мінеральна, метилпарабен (Е 218), етоксильовані природні спирти С16-С18, моногліцериди дистильовані, парафін білий м'який, вода очищена.

Лікарська форма. Мазь.

Від майже білого до жовтуватого кольору мазь з характерним запахом і дрібними гранулами жиру.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Зентіва» / Zentiva k.s.

У кабеловни 130, 102 37 Прага 10, Долні Мехолупи, Чеська Республіка / U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolni Mecholupi, Czech Republic.

Фармакотерапевтична група. Протигрибкові засоби для місцевого застосування. Код АТС D01A E04.

Ундециленова кислота та її солі чинять фунгістатичну, а в більших концентраціях – фунгіцидну дію щодо дерматофітів *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporon audouinii*. Препарату також властива певною мірою бактеріостатична дія щодо штамів *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus rettgeri*, *Aeromonas hydrophila*, *Yersinia enterocolitica*.

Цинк, який є складовою цинку ундециленату, стягує шкіру, зменшуючи її подразнення та прискорюючи загоєння.

Показання для застосування. Поверхневі мікози шкіри, спричинені мікроорганізмами, чутливими до діючих речовин препарату, зокрема дерматомікоз гладенької шкіри, паховий дерматомікоз, дерматомікоз стоп, міжпальцевий дерматомікоз, у тому числі змішані кандидозні та бактеріальні інфекції.

З профілактичною метою препарат призначати при надмірному потовиділенні, при проявах подразнення у місцях вологості поприлості (пахові ділянки, під молочними залозами), пітниці.

Протипоказання. Підвищена чутливість до діючих речовин та до будь-яких інших компонентів препарату, зокрема до ундециленатів та парабенів. Дитячий вік до 2 років. Мазь не можна наносити на мокнучі ділянки шкіри, виразки та пухирі, слід уникати потрапляння в очі та на ділянки навколо очей.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Слід уникати потрапляння в очі та на ділянки навколо очей.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Експериментальні дослідження не проводилися. Також не проводили дослідження з участю вагітних жінок або матерів, які годують груддю. З іншого боку, у матерів або дітей не спостерігалось жодних побічних ефектів після місцевого застосування ундециленатів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Мікосептин не має побічного впливу на увагу та зосередженість.

Діти. Мікосептин® застосовувати дітям віком від 2 років.

Спосіб застосування та дози. Для лікування дорослих і дітей віком від 2 років мазь наносити на вимиту суху шкіру двічі на день упродовж щонайменше одного тижня. Після зникнення клінічних ознак лікування продовжувати, застосовуючи мазь 1 раз на день протягом ще 1 тижня, а потім – через день або двічі на тиждень. Загалом лікування триває 1 місяць. Скорочення курсу лікування може призвести до появи рецидиву.

Передозування. У разі випадкового прийому внутрішньо у дітей можливі поява нудоти та блювання. Рекомендується штучно викликати блювання.

Побічні ефекти.

Зазвичай препарат переноситься добре.

Протягом курсу лікування може розвинути реакція підвищеної чутливості до деяких інгредієнтів препарату. До ознак такої підвищеної чутливості належать свербіж, почервоніння (гіперемія), припухлість шкіри (набряки), відчуття печіння, шкірні висипи. Іноді – виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів, незначне подразнення шкіри, екзема (зникає самостійно після припинення застосування препарату).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 30 г мазі у тубі; по 1 тубі в картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.