

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

СПАСКУПРЕЛЬ
(SPASCUPREEL[®])

Склад:

діючі речовини: 1,1 мл розчину містять: Aconitum napellus D6 – 2,2 мг, Amanita muscaria D4 – 0,55 мг, Ammonium bromatum D4 – 1,1 мг, Atropinum sulfuricum D6 – 1,1 мг, Citrullus colocynthis D4 – 1,1 мг, Cuprum sulfuricum D6 – 0,55 мг, Gelsemium sempervirens D6 – 1,1 мг, Magnesium phosphoricum D6 – 1,1 мг, Matricaria recutita D3 – 0,55 мг, Passiflora incarnata D2 – 0,55 мг, Veratrum album D6 – 1,1 мг;
допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.

Клінічні характеристики.

Показання. Спазми гладкої мускулатури органів (шлунок, кишечник, жовчний міхур, матка, сечовивідні шляхи); спастичність поперечно-смугастої мускулатури (міогельоз, затвердіння м'язів).

Протипоказання. Вагітність. Період годування груддю. Підвищена чутливість до ромашки лікарської або до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Якщо симптоми не зникають чи стан пацієнта погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Невідома.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових або підшкірних, внутрішньошкірних і внутрішньовенних ін'єкцій.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – 1,1 мл.

Застосовувати по 1 разовій дозі 1-3 рази на тиждень, у гострих випадках – до 3 ампул на добу з інтервалом між введеннями 4 години.

Звичайна тривалість лікування становить до 2 тижнів. Довготривале застосування препарату (протягом кількох місяців) слід проводити під наглядом лікаря.

Діти. Препарат застосовувати для лікування дітей віком від 12 років.

Передозування. Не відзначалося.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можуть виникати тимчасові шкірні алергічні реакції. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності. 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Несумісність. Препарат не слід змішувати з іншими лікарськими засобами в одній ємкості, окрім препаратів виробника Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ (Biologische Heilmittel Heel GmbH).

Упаковка. 5 (5x1), 10 (5x2) або 100 (5x20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.