

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГАСТРО-ГРАН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 10 г гранул містять Anacardium 200CH 20 мг; Nux vomica 1000CH 20 мг; Arsenicum album 1000CH 20 мг; Argentum nitricum 1000CH 20 мг; Kalium bichromicum 200CH 20 мг;

допоміжна речовина: цукор кондитерський.

Лікарська форма. Гранули.

Гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

Назва і місцезнаходження заявника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 76-78.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

Фармакотерапевтична група.

Комплексний гомеопатичний лікарський засіб.

Послаблює біль, явища диспепсії, прискорює загоєння ерозій та виразок. Чинить регулювальну дію на вегетативну нервову систему, сприяє поліпшенню мікроциркуляції в ділянці травного тракту, покращує перистальтику.

Показання для застосування.

У складі комплексного лікування: гастрити, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомами повинен становити не менше 30 хв.

Пацієнтам із рідкісною вродженою непереносимістю фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози-галактози або дефіцитом сахарози-ізомальтази не слід застосовувати препарат.

Препарат містить крупку цукрову, що слід враховувати пацієнтам з цукровим діабетом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності і годування груддю не досліджувалось.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не призначають дітям віком до 1 року.

Дітям віком від 1 до 3 років застосування препарату можливе тільки за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям від 7 років – по 7 гранул під язик до повного розсмоктування; дітям від 1 до 7 років – із розрахунку 1 гранула на рік життя (на 1 прийом), розчинені в невеликій кількості води або під язик. Гранули слід приймати за 15-20 хв до або через 1 годину після їди.

Приймати 3–5 разів на добу до стійкого покращання стану.

Після зникнення симптоматики рекомендується продовжити прийом препарату 2 рази на добу протягом 7 днів.

При хронічних гастритах – 1–2 рази на добу протягом 2–3 місяців.

За необхідності курс лікування повторити через 2-3 тижні.

Передозування.

У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але у осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливе посилення проявів побічних реакцій.

Побічні ефекти. Можливі реакції гіперчутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можливе сумісне застосування з будь-якими методами лікування і лікарськими засобами (у тому числі антибіотиками, протизапальними засобами, вітамінами). Інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.