

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ШАВЛІЯ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 таблетка для розсмоктування містить: екстракту шавлії сухого (FOLIA SALVIAE OFFICINALIS L) ((5,0-6,0:1) екстрагент вода) - 12,5 мг, олії шавлії есенціальної (FOLIA SALVIAE OFFICINALIS L) - 2,4 мг;

допоміжні речовини: кислота аскорбінова, кислота яблучна, аспартам (Е 951), сорбіт (Е 420), магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний, ароматизатор медовий (містить пропіленгліколь), харчовий барвник «Індигокармін» (Е 132) та харчовий барвник «Хіноліновий жовтий» (Е 104) .

Лікарська форма. Таблетки для розсмоктування.

Таблетки плоскі круглі зі скошеним краєм, блакитнувато-зеленого кольору зі світлішими і темнішими вкрапленнями, зі специфічним запахом. З обох боків таблетки гравіювання «NP» на тлі дерева.

Назва і місце знаходження виробника.

Херкель Б.В.

Нобельвег 6, 3899 BN Зеєвольде, Нідерланди;

Herkel B.V.,

Nobelweg 6, 3899 BN Zeewolde, the Netherlands .

на замовлення та під контролем:

Natur Produkt Europe, the Netherlands

Натур Продукт Європа Б.В., Нідерланди.

Фармакотерапевтична група.

Засоби для місцевого застосування у стоматології. Код АТС А01А D11.

Антисептичний засіб рослинного походження. Комбінований препарат, що містить комплекс біологічно активних речовин.

Проявляє протизапальну, протимікробну, відхаркувальну дію. Володіє в'язучими властивостями.

Показання для застосування.

Для місцевого лікування у складі комплексної терапії запальних захворювань порожнини рота, глотки та верхніх дихальних шляхів: стоматити, гінгівіти, ларингіти, фарингіти, ушкодження слизової оболонки порожнини рота.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гострий нефрит.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не застосовувати хворим на фенілкетонурію, у зв'язку з тим, що препарат містить у своєму складі аспартам .

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності або годування груддю застосовувати препарат протипоказано .

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами . Не впливає.

Діти. Не застосовують дітям до 5 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати місцево, тримаючи у порожнині рота до повного розсмоктування, не розжовуючи.

Дорослим та дітям віком від 15 років: 6 таблеток на добу з інтервалом 2 години.

Дітям віком від 10 до 15 років: 4 таблетки на добу з інтервалом 3 години.

Дітям віком від 5 до 10 років: 3 таблетки на добу з інтервалом 4 години.

Тривалість курсу лікування не має перевищувати 7 днів .

Передозування .

Можливе посилення проявів побічних реакцій . Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Іноді можливе виникнення алергічних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Клінічно значущої взаємодії препарату з лікарськими засобами інших груп не виявлено.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка.

По 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці .

Категорія відпуску. Без рецепта.