

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ГЕРОВІТАЛ ДР. ТАЙСС**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 10 г розчину містять заліза (ІІ) лактату 2,5 мг, вітаміну А (ретинолу пальмітату) 145 МО, вітаміну D<sub>3</sub> (холекальциферолу) 1,25 мкг, вітаміну B<sub>1</sub> (тіаміну гідрохлориду) 0,6 мг, вітаміну B<sub>2</sub> (рибофлавіну натрію фосфату) 0,9 мг, вітаміну B<sub>6</sub> (піридоксину гідрохлориду) 0,9 мг, вітаміну С (аскорбінової кислоти) 45 мг, вітаміну Е (токоферолу ацетату) 6 мг, нікотинаміду 7,5 мг, декспантенолу 4 мг, вітаміну B<sub>12</sub> (цианокобаламіну) 0,5 мкг, екстракту рідкого (1:5) 75 мг (з 8 мг плодів глоду, 2 мг листя і квіток глоду, 5 мг трави крапиви собачої);  
*допоміжні речовини:* макроголгліцеролрицинолеат (кремофор® EL), гліцерин, пропіленгліколь, барвник Е 160 е, кислота лимонна безводна, етанол 96 %, бутилгідроксіанізол (Е 320), калію сорбат, апельсиновий ароматизатор, сахарин натрію, метилпарагідроксибензоат (Е 218), вода очищена.

**Лікарська форма.** Розчин для перорального застосування.

Прозорий розчин оранжево-жовтого кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ.

Міхелінштрассе 10

66424 Хомбург

Німеччина.

**Фармакотерапевтична група.** Полівітамінні препарати з іншими добавками.

Код ATC A11A B.

Дія Геровіталу Др. Тайсс визначається компонентами, що входять до його складу. Вітаміни є важливими складовими ферментативних систем, які беруть участь в основних окисно-віднових процесах в організмі. Залізо є важливим компонентом гемоглобіну і тканинних ферментів, бере участь в еритропоезі. Біологічно активні речовини рослинних екстрактів позитивно впливають на функції серцево-судинної та нервової систем.

**Показання для застосування.** Тривалі фізичні та нервові навантаження, особливо у людей літнього віку; період одужання після хвороб, операцій; лікування та профілактика гіповітамінозів, анемій у дорослих.

**Протипоказання.** Гіперкальціємія, гіперкальціурія, гіпервітаміноз вітамінів А, D, ниркова недостатність, одночасний прийом з ретиноїдами та препаратами, що містять вітаміни А, D, залізо, гемохроматоз, гемосидероз, анемії при порушенні обміну заліза (залізорефрактерна анемія, свинцева анемія, таласемія).

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Геровітал Др.Тайсс містить 15 % спирту.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Через вміст у Геровіталі 15 % спирту, а також через недостатність токсикологічних досліджень препарат не слід приймати під час вагітності та у період годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Даний лікарський засіб містить 15 % спирту. Це потрібно враховувати при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

**Діти.** Препарат призначений для лікування тільки дорослих.

**Спосіб застосування та дози.** Дорослим слід приймати по одній столовій ложці двічі на добу до або під час їди. Одна столова ложка (15 мл) містить 14,96 г препарату.

Перед використанням треба збовтати вміст флакона.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально, як правило, лікування становить не менше 30 днів.

Максимальна добова доза – 30 мл. Максимальна курсова доза – 900 мл.

**Передозування.** Передозування Геровіталом Др.Тайсс не спостерігалося, але, як і інші препарати, що містять вітаміни, у великих дозах він може спричинити головний біль, запаморочення, бл涓ання (вітамін А), тахікардію, артеріальну гіпотензію, раптове підвищене потовиділення, утруднене дихання, висипання (нікотинамід). Передозування залізом та іншими вітамінами, що містяться в Геровіталі Др.Тайсс, практично неможливо.

Терапія – симптоматична. У разі передозування необхідно звернутися до лікаря.

**Побічні ефекти.** Головний біль, запаморочення; нудота, біль у шлунку, бл涓ання, діарея; шкірні висипання, свербіж.

Можливе забарвлення калу в чорний колір, зміна кольору сечі.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Вітамін В<sub>6</sub> може прискорити метаболізм леводопи, що понижує терапевтичну активність цього препарату. При одночасному застосуванні ізонікотингідразиду, пеніциламіну і циклосерину можливо зниження ефективності вітаміну В<sub>6</sub>, що входить до складу препарату. Вітамін А може послабити дію бетаметазону при одночасному прийомі. Вітамін С може послабити дію трициклічних антидепресантів, антикоагулянтів, флуфеназину, ізопреналіну, нітрофурантойну; підсилити дію саліцилатів.

**Термін придатності.** 3 роки.

*Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.*

**Умови зберігання.** Зберігати у недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C. Помутніння препарату не впливає на якість препарату.

**Упаковка.** Скляні флакони об'ємом 60 мл, 200 мл або 500 мл у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта – 60 мл, 200 мл. За рецептом – 500 мл.