

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ХЕДРІНГ®
(HEADRING®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 мл лосьйону містить диметикону 40 мг;
допоміжна речовина: циклометикон 5.

Лікарська форма.

Лосьйон.
Прозора, безбарвна рідина

Назва і місцезнаходження виробника.

Торнтон енд Росс Лтд, Хаддерсфелд, HD7 5QH, Великобританія.
Thornton & Ross Ltd, Huddersfield, HD7 5QH, United Kingdom.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, які застосовуються при ектопаразитах, у тому числі при корості.
Код АТС P03AX.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Розчин містить диметикон, що застосовується у багатьох фармацевтичних і косметичних засобах. Встановлено, що диметикон у 4 % концентрації пригнічує фізико-фізіологічну активність вошей та виявляє овіцидну активність.

ХедРінг® не містить нейротоксичних фосфорорганічних інсектицидів, тому не здійснює хімічної дії. ХедРінг® діє на паразитів шляхом фізичного процесу – він покриває воші та порушує здатність їх організму підтримувати водний баланс, внаслідок чого комахи, оброблені засобом, втрачають здатність виводити надлишок води та гинуть. ХедРінг® діє навіть на тих вошей, котрі проявляють резистентність до інсектицидів.

Фармакокінетика. ХедРінг® застосовується місцево на уражену поверхню, але його всмоктування крізь шкіру незначне або відсутнє взагалі.

Показання для застосування.

Педикульоз (видалення головних вошей та їхніх яєць).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Особливі застереження.

Припинити застосування при появі висипу на шкірі або інших ознак місцевої або загальної підвищеної чутливості.

Препарат призначений тільки для зовнішнього застосування.

При випадковому потраплянні в очі промити їх водою.

Не вдихати.

У той час, коли ХедРінг® нанесено на волосся, уникати контакту з відкритим вогнем, сигаретами та іншими джерелами займання. ХедРінг® не містить водної основи та не зможе запобігти займанню волосся.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Даних про те, що ХедРінг® не можна застосовувати у період вагітності або годування груддю, немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Невідома.

Діти. Застосування у дітей віком до 6 місяців має відбуватися під наглядом лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі і діти (віком від шести місяців та старше).

Нанести та розподілити лосьйон на сухе волосся/які коренів до кінчиків, таким чином, щоб засіб було розподілено на всю площу волосистої частини голови. ХедРінг® слід залишити на волосі щонайменше на 1 годину. Потім вимити голову звичайним шампунем, ретельно промити водою. Повторити лікування через сім днів.

Лосьйон з розпилювачем: зняти запобіжний клапан, нанести достатню кількість лосьйону на сухе волосся за допомогою розпилювача, тримаючи флакон на відстані 10 см від волосся.

Передозування.

Випадки передозування не відомі.

Побічні ефекти.

Диметикон звичайно добре переноситься. До побічних явищ належать свербіж або лущення шкіри волосистої частини голови і подразнення/вологість навколо очей.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 30 °С, у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.

Упаковка.

По 50 мл або 100 мл лосьйону у флаконі. 1 флакон у картонній коробці.

По 60 мл або 100 мл лосьйону у флаконі з розпилювачем. 1 флакон з розпилювачем у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.