

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

НЕО-АНГІН® без цукру
(NEO-ANGIN® SUGAR FREE)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 льодяник містить 2,4-дихлорбензилового спирту 1,2 мг, амільметакрезол 0,6 мг, левоментолу 5,72 мг;
допоміжні речовини: олія зірчастого анісу, олія м'яти перцевої, барвник Понсо 4 R (E 124), ізомальт, кислота винна.

Лікарська форма. Льодяники.

Круглі червоні, двоопуклі, злегка прозорі льодяники.

Назва і місцезнаходження виробників.

Дивафарма ГмбХ/Divapharma GmbH.
Мотцнер штрассе, 41, 12277, Берлін, Німеччина/Motzener Strasse, 41, 12277, Berlin, Germany.
Клостерфрау Берлін ГмбХ/KlosterfrauBerlin GmbH.
Мотцнер штрассе 41, 12277, Берлін, Німеччина/Motzener Strasse, 41, 12277, Berlin, Germany.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, які застосовуються при захворюваннях горла. Комбіновані антисептики.
Код АТС R02A A20.

Нео-ангін[®] без цукру активний щодо широкого спектра граммпозитивних і грамнегативних мікроорганізмів *in vitro*; виявляє протигрибкову активність. Ефективність препарату зумовлена наявністю двох антибактеріальних компонентів широкого спектра дії, які полегшують біль у горлі та зменшують дію бактерій, що має наслідком бактерицидний ефект. 2,4-дихлорбензиловий спирт чинить бактеріостатичну дію за рахунок зневоднення бактеріальної клітини.

Левоментол доповнює дію двох інших складових препарату анальгезуючим ефектом, зумовленим стимуляцією холодових рецепторів слизової оболонки.

Нео-Ангін[®] без цукру добре переноситься та має приємний смак.

Показання для застосування.

Місцеве лікування (у складі комплексної терапії) інфекційно-запальних захворювань порожнини рота, горла та гортані: стоматит, гінгівіт, тонзиліт, початкова стадія ангіни, фарингіт, ларингіт.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 6 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Якщо симптоми захворювання зберігаються більше 3 днів, супроводжуються високою температурою, головним болем або іншими явищами, необхідно звернутися до лікаря для коригування схеми лікування.

Препарат не слід застосовувати пацієнтам з непереносимістю фруктози, синдромі мальабсорбції глюкози-галактози, сахарози-ізомальтози.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та ефективність застосування препарату під час вагітності або годування груддю не встановлені. Застосування під час вагітності можливе тільки у випадку, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Препарат не слід застосовувати у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Нео-ангін[®] без цукру протипоказаний для застосування дітям віком до 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим і дітям віком від 6 років Нео-ангін[®] без цукру рекомендується повільно розсмоктувати по 1 льодянику кожні 2-3 години, але не більше 6 льодяників на добу. Тривалість лікування становить 3-5 днів.

Передозування.

Симптоми: можливий дискомфорт з боку травного тракту.

Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції, у тому числі гіперемія шкіри, свербіж, висипання на шкірі, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, набряк та біль губ, язика чи горла.

З боку органів травлення, у тому числі стоматит, відчуття печіння, пощипування чи болю у роті, глосит, глосодинія; диспепсія, нудота, блювання. Ізомальт, що входить до складу препарату, може викликати слабкий проносний ефект. Препарат містить барвник Е 124, який може спричинити алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

2 блістери по 8 льодяників або 2 блістери по 12 льодяників, або 4 блістери по 12 льодяників у картонних коробках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.