

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату

ТРИХОМОНАДЕН-ФЛЮОР-ІН'ЄЛЬ
(TRICHOMONADEN-FLUOR-INJEEL[®])

Склад:

діючі речовини: 1,1 мл розчину містить: Trichomonaden fluor Nosode D10 – 367 мг, Trichomonaden fluor Nosode D30 – 367 мг, Trichomonaden fluor Nosode D200 – 367 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Гомеопатичний препарат.

Клінічні характеристики.

Показання.

У комплексній терапії гострих та хронічних запальних захворювань сечостатевої системи у чоловіків і жінок, пов'язаних з трихомоніазом (ендометрит, сальпінгіт та оофорит, уретрит, простатит), що перебігають з вираженим свербінням та великою кількістю виділень.

У комплексній терапії хронічних запальних захворювань соматичних органів, що виникають на фоні хронічного перебігу трихомоніазу.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям від 12 років – 1,1 мл. Застосовувати разову дозу 1-3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних ін'єкцій, а також в акупунктурні точки або перорально (розчинити разову дозу в 5-10 мл води та випити, затримуючи на декілька секунд у роті).

Курс лікування: 2-4 тижні.

Побічні реакції.

Реакції гіперчутливості; реакції у місці введення.

Передозування.

Не відзначалося.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Токсичність у період вагітності та годування груддю гомеопатично розведених речовин, що входять до складу даного лікарського засобу, не встановлена. Жодних небажаних реакцій не виявлено.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально з урахуванням користі/ризиків.

Діти.

Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 12 років.

Особливості застосування.

На початку лікування можливе короткочасне посилення виділень із статевих шляхів, що є ознакою активного виведення токсинів і не потребує припинення лікування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

Фармакологічні властивості.

Фармакокінетика. Препарат чинить специфічну імунокоригуючу, дезінтоксикаційну та протизапальну дію при трихомонадній інфекції. Дія препарату базується на активації імунітету та детоксикаційних процесів в організмі і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин, які входять до складу препарату.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху і практично вільний від часток.

Несумісність.

Невідома.

Термін придатності. 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

5 ампул та 100 (5x20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.