

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ГОРОБИНИ ЧОРНОПЛІДНОЇ ПЛОДИ

(ARONIAEMELANOCARPAEFRUCTUS)

Склад:

діюча речовина: горобини чорноплідної плоди;

1 пачка містить: горобини чорноплідної плоди – 75 г, або 100 г, або 150 г.

Лікарська форма. Плоди.

Основні фізико-хімічні властивості: плоди яблукоподібні, іноді з плодоніжками, кулясті Колір плодів чорний, пурпурово -чорний, м'якоть фіолетово-червона, майже чорна

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що діють на метаболізм та на систему травлення Код АТХ А16А Х.

Клінічні характеристики.

Показання.

У комплексній терапії при гіпо- та авітамінозах, геморагічних діатезах, кровотечах різного походження, початкових стадіях артеріальної гіпертензії, тиреотоксикозу, атеросклерозу.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гіперацидний гастрит, тромбози, тромбофлебії, підвищена властивість крові до зсідання, виражена артеріальна гіпотензія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дія препарату посилюється при одночасному прийомі рослин з вмістом аскорбінової кислоти (плоди шипшини, чорної смородини).

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості застосування.

Перед початком лікування слід порадитися з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Немає даних.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45-60 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по ½ склянки 3-4 рази на добу після їди.

Перед застосуванням настій рекомендується збовтати.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Діти. У зв'язку з відсутністю достатніх клінічних даних щодо застосування препарату дітям, його не слід призначати даній категорії пацієнтів.

Передозування. Посилення проявів побічних реакцій. Терапія симптоматична.

Побічні реакції. Можливі алергічні реакції в осіб із гіперчутливістю. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря .

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30°C.

Упаковка. По 75 г, або 100 г, або 150 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.