

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина : сірка;

1 г мазі містить 0,33 г сірки;

допоміжні речовини : парафін білий м'який, вода очищена, емульгатор Т2.

Лікарська форма. Мазь 33,3%.

Мазь жовтуватого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
69063, м Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Місцеві протипаразитарні протимікробні засоби.
Препарати, що містять сірку. Код АТС D10A B02.

Сірчана мазь проста має протимікробну і протипаразитарну дію. При взаємодії сірки з органічними речовинами утворюються сульфіди і пентагідроокислота, які чинять антисептичну дію.

При зовнішньому застосуванні сірчаної мазі простої сірка та вазелін, які входять до її складу, практично не абсорбуються у системний кровообіг.

Показання для застосування. Захворювання шкіри – себорея, сикоз, мікози, псоріаз. Лікування корости (у складі комбінованої терапії).

Протипоказання. Підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі. Руки після нанесення мазі слід ретельно мити.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека та клінічна ефективність препарату при вагітності та в період годування груддю не вивчалися.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Вплив препарату на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами не описаний.

Діти. Протипоказано дітям віком до 3 років. Дітям віком від 3 до 12 років застосовувати препарат тільки за рекомендацією лікаря з урахуванням співвідношення користь/ризик.

Спосіб застосування та дози . Сірчану мазь просту застосовують зовнішньо. Мазь наносять на уражені ділянки шкіри 2-3 рази на добу. При лікуванні корости схема застосування препарату та вимоги щодо дотримання правил особистої гігієни визначаються індивідуально лікарем.

Передозування. Не спостерігалось.

Побічні ефекти. В окремих випадках можливі місцеві реакції підвищеної чутливості.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть створюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом. Взаємодія мазі з окиснювачами (пероксидом водню, калію перманганатом) може призвести до хімічного опіку.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С; не допускається заморожування. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 25 г або по 50 г у контейнерах.

Категорія відпуску. Без рецепта.