

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

СИРОП ВІД КАШЛЮ З ПОДРОЖНИКОМ ТА МАТИ- Й-МАЧУХОЮ

Склад:

діючі речовини: 100 мл сиропу містять: подорожника ланцетлистого листя екстракт рідкий (Plantago lanceolata) (1:1) (екстрагент – етанол 40 %) –5,0 г; мати-й-мачухи листя екстракт рідкий (Tussilago farfara) (1:1) (екстрагент – етанол 40 %) –5,0 г; олія м'ятна (Mint oil) - 0,01 г; олія евкаліпта (Eucalyptus oil) - 0,01 г;

допоміжні речовини: мед, карамель (E 150d), коричневий тростинний цукор, калію сорбат, вода очищена

Лікарська форма. Сироп.

Основні фізико-хімічні властивості: коричневого кольору в'язка рідина з характерним запахом. Допускається легка опалесценція.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркуючі засоби рослинного походження. Код АТХ R05C A10.

Фармакологічні властивості.

Комбінований засіб рослинного походження; має відхаркувальну та протизапальну дію.

Подорожник має відхаркувальну, протизапальну, знеболювальну, бактеріостатичну та протиалергічну дію.

Мати-й-мачуха – має протизапальну, пом'якшувальну, легку потогінну та слабку спазмолітичну дію.

Евкаліптова олія чинить стимулюючу дію на рецептори слизових оболонок, має протизапальну та антисептичну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

У складі комплексної терапії гострих та хронічних захворювань дихальних шляхів (трахеїт, трахеобронхіт, бронхіт, бронхопневмонія).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату; діабет, вагітність, період годування груддю, дитячий вік (до 6 років), бронхіальна астма, бронхоспазм; запальні захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчовивідних шляхів; захворювання печінки тяжкого перебігу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Сироп від кашлю з подорожником та мати-й-мачухою не слід застосовувати одночасно з препаратами, що містять кодеїн та інші протикашльові лікарські засоби, оскільки це перешкоджає виділенню розрідженого мокротиння.

Особливості застосування.

Якщо під час застосування лікарського засобу з'являється задишка, гарячка, гнійна мокрота, слід проконсультуватися з лікарем. Пацієнтам зі зниженою функцією нирок чи пацієнтам, які дотримуються дієти з контролем надходження калію, слід зважити доцільність прийому препарату. З обережністю застосовувати препарат хворим, які страждають на гіперацидний гастрит, виразкову хворобу шлунка з підвищеною кислотністю; рефлюкс-езофагіт.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає на здатність керувати автомобілем або працювати зі складними механізмами.

Діти. Не рекомендується застосовувати препарат дітям віком до 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовувати внутрішньо.

Дітям від 6 до 10 років – по 1 чайній ложці 2-3 рази на добу;

дітям від 10 до 15 років – по 2 чайні ложки 2-3 рази на добу;

дорослим та дітям віком від 15 років - по 1-2 столові ложки 3-4 рази на добу. Курс

лікування – 2-3 тижні. Збільшення тривалості прийому та доцільність проведення повторних курсів лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

На даний час випадки передозування не описані

При передозуванні, наприклад, при випадковому застосуванні вмісту всього флакона можуть виникнути шлунково-кишкові розлади. Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця. Терапія симптоматична.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, кропив'янка, свербіж, набряк шкіри), контактний дерматит (у ділянці губ); диспепсичні реакції, включаючи печію, нудота, блювання, діарея.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. У захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. Сироп по 100 мл у флаконі з темного скла або у темному пластиковому флаконі; по 1 флакону у картонній пацці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Херкель Б.В.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Нобельвег 6, 3899 БН Зеевольде, Нідерланди