

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**УРОХОЛУМ**  
**(UROCHOLUM)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 мл препарату містить водно-спиртовий екстракт (1:1) (екстрагент – етанол 40 %) із суміші: моркви дикої плоді (*Dauci carotae fructus*) 200 мг, ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) 180 мг, споришу трави (*Polygoni avicularis herba*) 150 мг, кукурудзи стовпчиків з приймочками (*Zea mays styli cum stigmatis*) 120 мг, бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) 100 мг, хвоща трави (*Equiseti herba*) 100 мг, хмелю шишок (*Lupuli flos*) 50 мг, берези бруньок (*Betulae gemmae*) 50 мг, звіробою трави (*Hyperici herba*) 40 мг, м'яти листя (*Menthae piperitae folia*) 10 мг;  
*допоміжні речовини:* крім екстрагенту, відсутні.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

Рідина темно-коричневого кольору зі специфічним ароматним запахом.  
При зберіганні допускається утворення осаду.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, вул.  
Лермонтовська, будинок 5.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, які застосовуються в урології Код АТС G04BD.

Комбінований препарат рослинного походження. Комплекс біологічно активних речовин Урохолуму, легко всмоктуючись у кров та стимулюючи нирковий та печінковий кровообіг, сприяє збільшенню сечо- та жовчовиділення, нормалізує тонус гладенької мускулатури верхніх сечовивідних шляхів і жовчного міхура, послаблює запальні процеси, чинить бактерицидну, діуретичну, жовчогінну, спазмолітичну дію. Урохолум чинить антиазотемічний ефект, виводить з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди. Сприяє виведенню піску та каменів з нирок, сечового та жовчного міхурів.

**Показання для застосування.**

У складі комплексної терапії гострих та хронічних захворювань (неспецифічної інфекції) сечовивідних шляхів (цистит, уретрит) та нирок (пієлонефрит), хронічних неінфекційних захворювань нирок (нефрит, нефроз); сечокам'яна, нирковокам'яна хвороби та сольовий діатез (профілактика утворення конкрементів, в т.ч. після їх видалення); хронічний холецистит, дискінезія жовчовивідних шляхів.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Зміна реологічних властивостей крові, обтураційна жовтяниця.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

З обережністю застосовувати у пацієнтів з шлунково-стравохідним рефлюксом (через можливе виникнення та/або посилення печії).

Не застосовувати препарат, якщо діаметр каменів перевищує 3 мм.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** Препарат не застосовують у період вагітності та годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Під час лікування слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

**Діти.** Препарат не застосовують дітям віком до 12 років.

#### **Спосіб застосування та дози.**

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати перед вживанням їжі по 10-20 крапель, розводячи невеликою кількістю води, тричі на добу.

Курс лікування визначається лікарем із врахуванням перебігу захворювання, характеру супутньої терапії та триває від 5 днів до 1 місяця. За призначенням лікаря курс терапії можна повторити.

Перед застосуванням збовтати, так як при зберіганні можливе утворення осаду.

#### **Передозування.**

Посилення побічних реакцій.

**Лікування:** при передозуванні необхідно призначити велику кількість теплового пиття та провести симптоматичне лікування.

#### **Побічні ефекти.**

Алергічні реакції (у т.ч. висипання, свербіж, гіперемія, набряк шкіри), запаморочення, диспептичні явища (нудота, блювання).

#### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

#### **Термін придатності.** 3 роки.

#### **Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

#### **Упаковка.**

По 25 мл або по 40 мл у флаконі в пачці.

#### **Категорія відпуску.** Без рецепта.

## **ІНСТРУКЦІЯ**

для медичного застосування препарату

## **УРОХОЛУМ (UROCHOLUM)**

#### **Склад лікарського засобу:**

**діючі речовини:** 1 мл препарату містить водно-спиртовий екстракт (1:1) (екстрагент – етанол 40 %) із суміші: моркви дикої плодів (*Dauci carotae fructus*) 200 мг, ортосифону тичинкового листя (*Orthosiphonis staminei folia*) 180 мг, споришу трави (*Polygoni avicularis herba*) 150 мг, кукурудзи стовпчиків з приймочками (*Zea mays styli cum stigmatis*) 120 мг, бузини чорної квіток (*Sambuci nigrae flores*) 100 мг, хвоща трави (*Equiseti herba*) 100 мг, хмелю шишок (*Lupuli flos*) 50 мг, берези бруньок (*Betulae gemmae*) 50 мг, звіробою трави (*Hyperici herba*) 40 мг, м'яты листя (*Menthae piperitae folia*) 10 мг;  
**допоміжні речовини:** крім екстрагенту, відсутні.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

Рідина темно-коричневого кольору зі специфічним ароматним запахом.  
При зберіганні допускається утворення осаду.

### **Назва і місцезнаходження виробника.**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка,  
4.

вул. Корольова, б.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, які застосовуються в урології Код АТС G04BD.

Комбінований препарат рослинного походження. Комплекс біологічно активних речовин Урохолуму, легко всмоктуючись у кров та стимулюючи нирковий та печінковий кровообіг, сприяє збільшенню сечо- та жовчовиділення, нормалізує тонус гладенької мускулатури верхніх сечовивідних шляхів і жовчного міхура, послаблює запальні процеси, чинить бактерицидну, діуретичну, жовчогінну, спазмолітичну дію. Урохолум чинить антиазотемічний ефект, виводить з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди. Сприяє виведенню піску та каменів з нирок, сечового та жовчного міхурів.

### **Показання для застосування.**

У складі комплексної терапії гострих та хронічних захворювань (неспецифічної інфекції) сечовивідних шляхів (цистит, уретрит) та нирок (пієлонефрит), хронічних неінфекційних захворювань нирок (нефрит, нефроз); сечокам'яна, нирковокам'яна хвороби та сольовий діатез (профілактика утворення конкрементів, в т.ч. після їх видалення); хронічний холецистит, дискінезія жовчовивідних шляхів.

### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Зміна реологічних властивостей крові, обтураційна жовтяниця.

### **Належні заходи безпеки при застосуванні.**

З обережністю застосовувати у пацієнтів з шлунково-стравохідним рефлюксом (через можливе виникнення та/або посилення печії).

Не застосовувати препарат, якщо діаметр каменів перевищує 3 мм.

### **Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Препарат не застосовують у період вагітності та годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Під час лікування слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

*Діти.* Препарат не застосовують дітям віком до 12 років.

### **Спосіб застосування та дози.**

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати перед вживанням їжі по 10-20 крапель, розводячи невеликою кількістю води, тричі на добу.

Курс лікування визначається лікарем із врахуванням перебігу захворювання, характеру супутньої терапії та триває від 5 днів до 1 місяця. За призначенням лікаря курс терапії можна повторити.

Перед застосуванням збовтати, так як при зберіганні можливе утворення осаду.

### **Передозування.**

Посилення побічних реакцій.

*Лікування:* при передозуванні необхідно призначити велику кількість теплої пиття та провести симптоматичне лікування.

**Побічні ефекти.**

Алергічні реакції (у т.ч. висипання, свербіж, гіперемія, набряк шкіри), запаморочення, диспептичні явища (нудота, блювання).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 25 мл або по 40 мл у флаконі в пачці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.