

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70%
(SPIRITUS AETHYLICUS 70%)

Склад:

діюча речовина: етанол;
етанолу не менше 69,3% і не більше 70,7% за об'ємом та вода очищена.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевопоздрознювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.

Фармакокінетика. При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

Клінічні характеристики.

Показання. Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хірургічна обробка рук хірургів.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.

Особливі заходи безпеки. У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. Зовнішньо – для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук. Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1 : 1.

Діти.

Застосовують за призначенням лікаря.

Передозування. При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

Побічні реакції. При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок. У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності. 5 років.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці. Бергти від вогню.

Упаковка. Флакони по 100 мл.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарма ЛТД».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 51473, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Межиріч, вул. Молодіжна 1а.

Заявник. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробнича фармацевтична компанія «Біо-Фарма плюс».

Місцезнаходження заявника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 49101, м. Дніпропетровськ, вул. О. Кониського 4-а, к.3.