

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КІНДІНОРМ
(KINDINORM®)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: для 10 г гранул використано Calcium hypophosphorosum D4 16,67 мг, Chamomilla D12 16,67 мг, Cuprum metallicum D10 16,67 мг, Kalium phosphoricum D6 16,67 мг, Staphisagria D12 16,67 мг, Valeriana D6 16,67 мг;
допоміжна речовина: сахароза.

Лікарська форма. Гранули.

Приблизно сферичні, білуваті гранули.

Назва і місцезнаходження виробника.

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Гомеопатичний комбінований лікарський засіб впливає на поведінкові і когнітивні розлади у дітей та дорослих. Активні компоненти препарату послаблюють типові симптоми такі як порушення концентрації уваги, підвищену збудливість, непосидючість, труднощі у навчанні, розлади сну і стани загальної слабкості. Також препарат виявляє заспокійливу і стабілізуючу дію на психічний стан пацієнта.

Показання для застосування.

Поведінкові розлади у дітей та дорослих, що супроводжуються порушенням концентрації уваги, підвищеною збудливістю, непосидючістю, труднощами у навчанні, розладами сну або загальною слабкістю.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Препарат містить сахарозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості фруктози, синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції або з недостатністю сахарози-ізомальтази не слід застосовувати препарат.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Кіндіном у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти.

Не слід застосовувати препарат дітям віком до 1 року через відсутність досвіду застосування.

Перш ніж розпочати прийом препарату Кіндіном дітям віком до 6 років, рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та діти віком старше 12 років: по 10-20 гранул 3 рази на добу;

діти віком від 5-ти до 12 років: по 10 гранул 3 рази на добу;

діти віком від 1-го до 5 років: по 5 гранул 3 рази на добу.

Курс лікування: у середньому близько 12 тижнів, при необхідності можливе збільшення тривалості прийому препарату після консультації з лікарем.

Гранули слід приймати за півгодини до або через півгодини після їди, даючи їм повільно розчинитися у роті. Дітям віком до 3 років для зручності застосування гранули можна розчиняти у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

Тривале лікування препаратом Кіндіном (6-8 тижнів при необхідності і більше) рекомендується проводити тільки після консультації з лікарем.

При відсутності поліпшення після 8 тижнів лікування препаратом або при погіршенні стану слід проконсультуватися з лікарем.

Передозування.

У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.

Термін придатності. 4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 г або 20 г гранул у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.