

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЗІРКА

Склад лікарського засобу :

діючі речовини: 1 г містить ментолу 658 мг, камфори 124 мг, олії м'яти перцевої 258 мг, олії евкаліптової 65 мг, олії гвоздичної 5 мг, олії коричної 6 мг;
допоміжна речовина: олія мінеральна.

Лікарська форма . Бальзам для інгаляцій у олівці.

Назва і місцезнаходження виробника.

Данафа Фармасьютікал Джоінт Сток Компані, В'єтнам.
вул. Зунг Сі Тхань Тхе, б.253, м. Дананг, В'єтнам.

Фармакотерапевтична група.

Комбіновані засоби для лікування захворювань порожнини носа. Код АТС R01A Х30.

Препарат належить до групи засобів, що стимулюють рецептори слизових оболонок, шкіри та підшкірних тканин. Має протизапальні, місцево зігріваючі, антисептичні, анестезуючі властивості, розширяє капіляри, покращуючи таким чином кровопостачання та незначною мірою знижує артеріальний тиск, діє на рефлекторні центри центральної нервової системи, проявляючи стимулюючий ефект. Дія олівця-інгалятора проявляється послабленням запального процесу та рефлекторним усуненням болю (головного, м'язового), спричиненого грипом, застудними захворюваннями та іншими чинниками.

Показання для застосування .

Симптоматичне лікування застуди, нежитю, головного болю, запаморочення, нудоти.

Протипоказання .

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату. Бронхіальна астма, коклюш, псевдокруп, схильність до судом.

Належні заходи безпеки при застосуванні .

Тільки для зовнішнього застосування. Уникати контакту бальзаму з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами.

Особливі застереження .

Застосування у період вагітності або годування груддю .

Через відсутність досвіду застосування бальзаму Зірка у період вагітності або годування груддю призначати препарат цієї категорії пацієнтів не рекомендується.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами .

У разі виникнення побічних реакцій з боку нервової системи (запаморочення, збудження, судоми) слід утриматися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Діти .

Протипоказаний дітям до 3 років.

Препарат слід з обережністю застосовувати дітям віком від 3 років у ділянці обличчя, оскільки він може спричинити бронхоспазм.

Спосіб застосування та дози .

Обережно вдихати, тримаючи інгалятор біля носа. По 1-2 вдихання в кожную ніздрю 10-15 разів на добу, до зникнення симптомів.

Передозування .

Можливе посилення проявів побічних реакцій, відчуття сильного тепла та печіння.

При випадковому потрапленні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання.

Лікування: промивання шлунка, симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, кропив'янку, свербіж, подразнення шкіри та слизових оболонок.

З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, збудження; можливе виникнення судом, спричинених камфорою.

З боку дихальної системи: при застосуванні препарату можливе збільшення ймовірності та частоти виникнення спазму бронхів, особливо у дітей.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дослідження щодо взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами не проводилися.

Термін придатності . 5 років.

Умови зберігання .

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Білого кольору пластмасова туба-олівець для інгаляцій з кришкою, що накручується. Всередині туби знаходиться фільтр циліндричної форми, просочений інгредієнтами; туба у картонній пачці.

Категорія відпуску . Без рецепта.