

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АМАРИН
(AMARIN)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл препарату містять: Gentiana lutea Ø 20 мл, Erythrea centaurium Ø 20 мл, Mentha piperita Ø 20 мл, Chamomillarecutita Ø 20 мл, Carum carvi Ø 10 мл, Atropa belladonna Ø 10 мл;

допоміжна речовина: етанол.

Препарат містить 66 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 24 краплі.

Лікарська форма. Краплі оральні, розчин.

Розчин зеленувато-коричневого кольору, дуже гіркий на смак.

Назва і місцезнаходження виробника.

Гербамед АГ, 9055 Бюлер, Швейцарія.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить стимулюючу, спазмолітичну, антисептичну, знеболювальну, протизапальну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного походження, які входять до складу препарату.

Показання для застосування.

Шлунково-кишкові розлади через порушення секреторних та скорочувальних функцій, такі як відрижка, метеоризм, відчуття важкості, шлунково-кишкові спазми, больовий синдром у шлунку на фоні стресу.

Протипоказання.

Шлункова та кишкова виразка, функціональна диспепсія та гіперхлоргідрія.

Особливі застереження.

Пацієнтам з дуже високим артеріальним тиском не рекомендовано застосовувати лікарські засоби, що містять екстракт *Gentiana lutea*.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Невідома.

Діти.

Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 11 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати при болях чи інших порушеннях діяльності травного тракту, вказаних у розділі «Показання до застосування», дорослим по 10-20 крапель, розведених у невеликій кількості рідини, не більше 3 разів на день, дітям старше 11 років – по 10 крапель, розведених у невеликій кількості рідини, не більше 3 разів на день.

Максимальна добова доза для дорослих становить 60 крапель, для дітей – 30 крапель.

Курс лікування : без обмеження. Якщо симптоми утримуються, необхідна консультація з лікарем.

Передозування.

Токсичні дії не відзначались.

Побічні ефекти.

У осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 50 мл.

Категорія відпуску.

Без рецепта.