

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЕПАЗИН
(HEPASIN)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини : 100 мл препарату містять: Silybum marianum Ø -40 мл, Cynara scolymus Ø - 20 мл, Artemisia absinthium Ø -20 мл, Chelidonium D1 - 10 мл, Fumaria Ø -10 мл;

допоміжна речовина : етанол.

Препарат містить 60 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 24 краплі.

Лікарська форма. Краплі оральні, розчин.

Прозорий розчин коричневатого кольору з аміноподібним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Гербамед АГ, Унтере Ау, 9055 Бюлер, Швейцарія.

Фармакотерапевтична група . Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить захисну, жовчогінну, гіполіпідемічну, знеболювальну, спазмолітичну дію та дію, що стимулює секрецію та травлення. Ця дія базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного походження, які входять до складу препарату.

Показання для застосування .

Печінкові та жовчні розлади, дисфункція жовчного міхура, а саме: спазми, відчуття наповненості, нудота, метеоризм, відсутність апетиту, відрижка, діарея, запор. Як підтримуючий препарат у випадку цукрового діабету, раку, хронічного запального захворювання печінки, цирозу та після гострого отруєння.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Лікарський засіб містить спирт.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Випадки негативного впливу не відомі.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Невідома.

Діти.

Препарат рек омендований для застосування дітям віком від 11 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують дорослим та дітям віком від 11 років внутрішньо.

Разова доза: дорослі – по 30 крапель, розведених у невеликій кількості рідини, 3 рази на день, діти старше 11 років – по 15 крапель, розведених у невеликій кількості рідини, 3 рази на день.

Максимальна добова доза: 90 крапель – для дорослих; 45 крапель – для дітей.

Курс лікування – 2 тижні. Якщо симптоми утримуються довше, необхідна консультація з лікарем.

Передозування.

Надмірна доза може викликати блювання, сильну діарею, затримку сечі чи безладні відчуття, спричинені вмістом *Artemisia absinthium* . Лікування.

Промивання шлунка, прийом сорбентів, симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

Можливий розвиток алергічних реакцій, які потребують відміни препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 50 мл.

Категорія відпуску.

Без рецепта.