

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КОНТУЗИН ГЕЛЬ
(CONTUSINGEL)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл препарату містять: *Symphytum officinalis* Ø -30 мл, *Calendula officinalis* Ø -20 мл, *Arnica montana* Ø - 10 мл, *Echinacea purpurea* Ø - 10 мл;

допоміжні речовини: етанол, гідроксіетилцелюлоза.

Препарат містить 43 % (м/м) етанолу.

Лікарська форма. Гель.

Коричневий прозорий гель із приємним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Гербамед АГ, Унтере Ау, 9055 Бюлер, Швейцарія.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить протизапальну, знеболювальну, протиревматичну, антимікробну дію; посилює грануляцію та сприяє загоєнню ран.

Показання для застосування.

Посттравматичні синдроми, спричинені розтягненням зв'язок, забиттям, закритими травмами, гематомами.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Не застосовувати на відкриті рани та слизові оболонки.

Застосування в період вагітності або годування груддю.

Відсутні дані щодо застосування препарату в період вагітності та годування груддю. Тому цим категоріям пацієнтів не рекомендовано застосовувати Контузин Гель.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Невідома.

Діти.

Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 5 років.

Спосіб застосування та дози.

Втирати гель тонким шаром в уражену зону, наносячи приблизно від 1 до 3 см гелю на один прийом, дорослим – до 5 разів на добу, дітям віком від 5 років – до 3 разів на добу.

Курс лікування: застосовувати не довше 6 тижнів.

Передозування.

Надмірна доза внаслідок довготривалого застосування може спричинити гепатотоксичну дію через присутність у складі препарату компонента *Symphytum*. У випадку підозри на передозування необхідно відразу ж зв'язатися з місцевим токсикологічним центром чи пунктом невідкладної допомоги. При короткочасному застосуванні згідно з рекомендованим дозуванням токсичні ефекти не відмічаються.

Побічні ефекти.

Свербіж чи почервоніння шкіри (у випадку гіперчутливості до *Arnica montana*).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Картонна коробка містить тубу поліетиленову на 90 г.

Категорія відпуску.

Без рецепта.