

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ДИЗОЛВІН
(DISSOLVIN)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл препарату містять: *Petasites hybridus* Ø -30 мл, *Cinchona pubescens* Ø - 20 мл, *Passiflora incarnata* Ø - 20 мл, *Filipendula ulmaria* Ø - 15 мл, *Salix alba* Ø - 15 мл;

допоміжна речовина: етанол.

Препарат містить 6,6 % об. етанолу.

1 мл препарату містить 24 краплі.

Лікарська форма. Краплі оральні, розчин.

Розчин червонувато-коричневого кольору з ароматним запахом та гіркуватим смаком.

Назва і місцезнаходження виробника.

Гербамед АГ, Унтере Ау, 9055 Бюлер, Швейцарія.

Фармакотерапевтична група . Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат чинить анальгетичну, спазмолітичну, антипіретичну, місцеву знеболювальну, седативну, протизапальну дію та має ефект в'язучого засобу за рахунок речовин рослинного походження, які входять до його складу .

Показання для застосування .

Застосовується при функціональних захворюваннях шлунка, кишечника та жовчних протоків, а також при головному та зубному болю.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату або до ацетилсаліцилової кислоти та її похідних; порушення функції печінки; виразкова хвороба в анамнезі; портальна гіпертензія; венозний застої; порушення згортання крові.

Дитячий вік до 11 років.

Особливі застереження.

При рецидивних чи стійких симптомах необхідна консультація з лікарем.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека та ефективність застосування не встановлені. Питання про можливість застосування вирішує лікар, враховуючи співвідношення ризик для дитини /користь для матері.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Діти.

Препарат рек омендований для застосування дітям віком від 11 років.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують внутрішньо. Дорослі – по 30 крапель, розведених у невеликій кількості рідини, 3 рази на день, діти старше 11 років – по 15 крапель, розведених у невеликій кількості рідини, 3 рази на день.

Не застосовувати довше 6 тижнів на рік.

Передозування.

Надмірна доза внаслідок безперервного застосування препарату може спричинити гепатотоксичні ефекти (ураження печінки через пошкодження структури клітинної мембрани піролізидиновими алкалоїдами), викликані вмістом *Petasites hybridus* .

Побічні ефекти.

Необхідно враховувати можливість появи алергічних реакцій. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці .

Упаковка.

Картонна коробка містить скляний флакон-крапельницю по 50 мл.

Категорія відпуску.

Без рецепта.