

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕКСИПІАЛ М ЛПОЛОСЬЙОН

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 мл емульсії нашкірної містить 40 мг сечовини;

допоміжні речовини: натрію лактату розчин (Е 325), к-ислота молочна (Е 270), т-риклозан, хлоргексидину дигідрохлорид, емульгатор W/O Type 1 (сорбітанізоостеарат, о-лія рицинова гідрогенізована ПЕГ-2, озокерит, олія рицинова гідрогенізована), макрогліцеролгідроксистеарат (о-лія рицинова гідрогенізована поліетиленгліколем-7), Елфакос Е 200 (метокси-поліетиленгліколь-22 / додецилгліколюсополімер), олія мінеральна легка, тригліцериди середнього ланцюга, д-иметикон 350, міристил лактат, ароматизатор Gerbera С 4518, вода очищена.

Лікарська форма. Емульсія нашкірна.

Рідка гомогенна масляниста емульсія від майже білого до білого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ШпірігФарма АГ/ SpirigPharma AG.

Фрошackerштрассе 6, 4622 Егеркінген, Швейцарія/ Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, Switzerland.

Фармакотерапевтична група. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією.

Код АТС D02A E01.

Сечовина є природним зволожуючим фактором зроговілого шару епідермісу.

Вона впливає на зв'язування води з внутрішньоклітинними білками. Вона не розчиняє кератин, але пом'якшує його. Концентрація сечовини у препараті неспричинює подразнення шкіри та підвищує бар'єрну функцію епідермісу. Допоміжні речовини формують емульсію типу вода в олії, що містить 36 % ліпідів.

Показання для застосування.

Лікування та захист подразненої або чутливої шкіри сухого та дуже сухого типу; як додаткове місцеве лікування захворювань шкіри, а також для догляду за шкірою у періоди ремісії. Лікування свербіж, atopічної екземи та псоріазу.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі застереження.

Для нашкірного застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Дозволяється застосовувати лікарський засіб під час вагітності та годування груддю. Не наносити препарат на ділянку молочних залоз жінкам у період лактації.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Дозволяється застосування дітям віком від 12 місяців, а віком від 6 місяців - тільки після консультації з лікарем.

Спосіб застосування та дози.

Дорослим та дітям застосовують 2-3 рази на добу. Препарат наносять на уражені ділянки шкіри. Звичайна тривалість лікування - не більше 6 тижнів. Якщо протягом декількох днів з початку лікування не настає покращення або симптоми погіршуються, проконсультуйтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату.

Передозування.

Невідомі.

Побічні ефекти.

Рідкісні симптоми підвищеної чутливості, почервоніння, печіння, свербіж.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій необхідно припинити застосування та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 200 мл; по 1 флакону у картонній коробці.

По 500 мл у флаконі.

Категорія відпуску.

Без рецепта.